Absolut™

Prothioconazole, Bixafen



- **Effet curatif et protecteur**
- **Augmente la tolérance au stress des céréales**
- **Résiste à la pluie après 30 minutes**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Fusariose foliaire, helminthosporiose des céréales (DTR), oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S.tritici ou S. nodorum), piétin-verse des céréales, grillures (PLS+RCC), helminthosporiose de l'orge, rhynchosporiose, rouille naine de l'orge.

Miscibilité

Absolut™ est miscible avec nos produits phyto-sanitaires.

Profil du produit

Formulation: EC - concentré émulsifiable

Matières actives: Bixafen 75 g/l
Prothioconazole 150 g/l

Classification GHE:

Attention



GHS 07 GHS 08 GHS 09

Mode d'action

Absolut™ est un fongicide combiné à large spectre, composé des deux matières actives de haute efficacité, à savoir Bixafen (un pyrazol-carboxamide) et Prothioconazole (un triazol). Les deux matières actives se caractérisent par un mode d'action systématique similaire. Après l'absorption dans la couche cireuse elles sont réparties durablement dans la plante. Grâce à une technologie toute récente le produit est absorbé immédiatement par la plante et résiste aux UV déjà une demi-heure après l'application. Absolut™ agit en préventif et curatif contre les champignons pathogènes et se caractérise par un effet durable. Grâce aux deux mécanismes d'action différents, Absolut ne provoque pas de résistances. Absolut™ encourage la photosynthèse et la vitalité des céréales. Les céréales supportent mieux le stress d'une sècheresse.

Application

Orge:	1 lt/ha, contre g*rillures (PLS+RCC), helminthosporiose de l'orge, oïdium des céréales, rhynchosporiose, rouille naine de l'orge.* Application: stade 31-51 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots et Ramularia collo-cygni.
Blé dur:	1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.
Épeautre:	1 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.
Triticale:	1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.
Blé:	1.25 lt/ha, contre *Fusariose foliaire. Effets secondaires.* Application: stade 39-61 (BBCH).
Blé:	1.25 lt/ha, contre *piétin-verse des céréales.* Application: stade 30-32 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations figurent dans les instructions du service d'homologation.
Blé:	1.25 lt/ha, contre *grillures (PLS), helminthosporiose des céréales (DTR), oïdium des céréales, rouille brune, rouille jaune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* 1 traitement par culture au maximum. PLS = Physiological Leaf Spots.
Seigle d'automne:	1.25 lt/ha, contre *oïdium des céréales, Rhynchosporiose, rouille brune, septorioses foliaires (S. tritici ou S. nodorum).* Application: stade 31-61 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Version: 04/2023

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch