Amilon™ 5

Molluschicida

Granulato anti-limacce, molto regolare, per la campicoltura, la frutticoltura, la viticoltura, le colture orticole e le piante ornamentali.

Prodotto	Amilon 5 è un esca pronta per l'uso (RB) e contiene 5 % Metaldeide. W-7083
Colture	Coltivazione di bacche, Campicoltura, Orticoltura, Frutticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Limacce del genere Arion, Limacce del genere Deroceras.
Applicazione **Coltivazione di bacche**	**Coltivazione di bacche in generale:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.
Frutticoltura	**Frutticoltura in generale:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.

Viticoltura	**Vite:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.
Orticoltura	**Orticoltura in generale:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.
Campicoltura	**Campicoltura in generale:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.
Coltivazione piante ornam.	**Coltivazione piante ornam. in generale:** 7kg/ha, contro *Limacce del genere Arion e del genere Deroceras*. Spargere sul suolo evitando le parti commestibili dei vegetali. L'intervallo tra due applicazioni successive deve essere almeno di 14 giorni. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non spargere il prodotto a mucchietti. Togliere e recuperare immediatamente il granulato accidentalmente fuoriuscito. Prodotto velenoso per gli animali domestici. Tenere le confezioni fuori dalla loro portata. Per la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici non utilizzare più di 700 g del principio attivo Metaldeide per ettaro

	sulla stessa particella durante un anno. Nessuna stesura manuale del granulato.
Modalità di azione	Ancora recentemente, si parlava per la metaldeide, che avesse un'azione disidratante a causa di un'abbondante secrezione di muco, dove un possibile recupero della limaccia in caso di forte umidità. Lavori realizzati in questi ultimi anni, mostrano che la metaldeide, altera l'apparato digestivo in maniera irreversibile, se la quantità tossica ingerita è sufficiente. I primi sintomi di intossicazione, è una produzione eccessiva di muco, poi l'animale è paralizzato.
Preparazione della miscela	Amilon 5 deve essere distribuito con un applicatore granulare. **Protezione dell'utente:** Durante il riempimento della macchina con il granulato: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione del granulato: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H361f Sospettato di nuocere alla fertilità. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	20 kg.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 20.02.25/RH/RF/LG0895

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch