Audienz®

Insetticida

Insetticida a lungo spettro per la frutticoltura, le colture di bacche, la viticoltura, le colture orticole e la campicoltura.

Prodotto	Audienz è una sospensione concentrata (SC) e contiene 44.2 % (480 g/l) Spinosad. (W-6020)
Colture	Coltivazione di bacche, campicoltura, orticoltura, frutticoltura, viticoltura, coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Altiche, antonomo del melo, antonomo delle fragole e dei lamponi, apioni dei capolini del trifoglio, boarmia, carpocapsa delle mele, cavolaie, cecidomia del cavolo, cimici, cimici dei frutti, criocere dei cereali, crisomelidi, dorifora della patata, drosophila suzukii, falene, larve defogliatrici, meligete della colza, minatrici, mosca del cavolo, mosca della barbabietola, mosca minatrice della colza, nottue (defogliatrici), nottue terricole o vermi grigi, piccola tortrice dei frutti, piralide del bosso, piralide del mais, tentredini, tignola del porro, tignola delle Crocifere, tignole della vite (Eupoecilia ambiguella e Lobesia botrana)[prima e seconda generazione], tortrice della vite, tortrici, tortrici ricamatrici, tripidi, tuta absoluta, verme del lampone.
Applicazione Coltivazione di bacche,	**Aronia nera, Mini-Kiwi:** 0.02 %, contro *drosophila suzukii*, Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Fragola:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *antonomo delle fragole o dei lamponi, tripidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura

	da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Fragola:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *drosophila suzukii*. Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Fragole rimontanti: intervallo di 21 giorni tra i trattamenti. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Fragola:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *Cimici dei frutti*. Termine d'attesa: 3 giorni. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. La dose indicata si riferisce allo stadio «piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini», 4 piante/m2, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Fragole rimontanti: intervallo di 21 giorni tra i trattamenti. Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. I prodotti non sono stati testati contro le Cimici dei frutti alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023. **Lampone:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *antonomo delle fragole o dei lamponi, verme del lampone*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Per i lamponi autunnali non è necessario combattere questi parassiti. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori

	del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Lampone:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *Drosophila suzukii*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Mirtillo, Specie di ribes:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *cimici, falene, larve defogliatrici, tentredini, tortrici, tripidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Mirtillo, Specie di ribes:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *drosophila suzukii*. Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Mora:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *drosophila suzukii*. Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 giorni.

	Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Sambuco nero:** 0.02%, contro *drosophila suzukii*. Applicazione: Stadi 85-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare / trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Sambuco nero:** 0.02%, contro *Larve defogliatrici, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Applicazione: Stadi 71-89 (BBCH). Stadi 51 - 59 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti a intervalli di 7 giorni.Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. SPe 8: Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di rubus:** 0.2 lt/ha, contro *Antonomo delle fragole o dei lamponi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Applicazione: Stadi 71-89 (BBCH). Stadi 19-59 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti ad un intervallo di 10 giorni. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento

Frutticoltura,	con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di rubus:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *cimici, falene, larve defogliatrici, tentredini, tortrici, tripidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti ad un intervallo di 10 giorni. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Ciliegio:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Drosophila suzukii*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Stadi 81-89 (BBCH). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api - Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva conformemente alle istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

	Ciliegio, Prugno / Susino: 0.02% (0.32 lt/ha), contro *falene, tortrici ricamatrici*. Applicazione: prefioritura o postfioritura (BBCH 57-59 o 69-71). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Frutta a granelli:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *cimici dei frutti*. Applicazione: prefioritura o postfioritura (BBCH 57-59 o 69-71). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Melo:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *antonomo del melo*. Applicazione: al germogliamento (BBCH 52 - 53). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. Al massimo 2 trattamenti a intervalli di 7 - 14 giorni contro questi agenti patogeni. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare / trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Melo, Pero / Nashi:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *carpocapsa delle mele, piccola tortrice dei frutti, tortrici ricamatrici*. Termine

	d'attesa: 3 settimane. Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare / trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Melo, Pero / Nashi:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *falene, tortrici ricamatrici*. Applicazione: prefioritura o postfioritura (BBCH 57-59 o 69-71). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare / trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Noce comune:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *carpocapsa delle mele*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni dell'UFAG. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Albicocco, prugno/susino, pesco/pesco noce:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Drosophila suzukii*. Termine d'attesa: 7 giorni. Trattare soltanto in presenza constatata di Drosophila suzukii nella particella o nelle sue vicinanze. Al massimo 2 trattamenti per particella e anno. Il dosaggio indicato si riferisce a un volume delle siepi di 10 000 m³/ha. Non utilizzare su frutti che a causa di

	lesioni secernono succo. Pericoloso per le api - Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Rispettare una fascia tampone non trattata di 20 metri da piante in fiore su particelle vicine. Tale distanza può essere ridotta se vengono applicate misure di riduzione della deriva conformemente alle istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023. **Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Cimici pentatomidi*. Applicazione: prefioritura o postfioritura (prima del BBCH 57 o a partire dal BBCH 69). Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo 2 trattamenti per particella e anno. Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m3/ha. Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. I prodotti non sono stati testati contro le Cimici pentatomidi alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023. **Nocciolo:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Balanino delle Nocciuole*. Applicazione: dopo la fioritura. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo 2 trattamenti per particella e anno. Il dosaggio indicato si riferisce a un volume delle siepi di 10 000 m3/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari,

Viticoltura,	malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025. **Pesco/pesco noce:** 0.2 lt/ha, contro *Tortrice orientale del pesco*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Postflorale. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Vite:** 0.015% (0.12 lt/ha), contro *boarmia, nottue terricole o vermi grigi*. Applicazione: Stadi 03 - 09 (BBCH). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 03-11 (B-D), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). **Vite:** 0.0067% (0.08 lt/ha), contro *drosophila suzukii*. Termine d'attesa: 7 giorni. Intervallo di 7 giorni tra i trattamenti. Al massimo 3 trattamenti contro la Drosophila suzukii durante lo stadio 83-89 (BBCH). Trattare soltanto in presenza constatata di deposizioni di uova nelle bacche a partire dallo stadio BBCH 83. La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo). Non utilizzare su frutti che a causa di lesioni secernono succo. Non trattare su uva da tavola. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). **Vite:** 0.015% (0.18 lt/ha), contro *tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)[Seconda generazione]*.

Orticoltura,	Applicazione: seconda generazione. Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. Due trattamenti ad un intervallo di 10-14 giorni. La dose indicata si riferisce ad un trattamento nella zona dei grappoli con una quantità standard di poltiglia di 1200 l/ha (base per il calcolo). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). **Vite:** 0.015% (0.18 lt/ha), contro *tignole della vite (Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)[Prima generazione]*. Applicazione: prima generazione. Stadio H (BBCH 55 - 59). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55-59 (H), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1000 l/ha (base per il calcolo). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). **Vite:** 0.015% (0.15 lt/ha), contro *tortrice della vite*. Effetto secondario: *tripidi*. Applicazione: Stadi 10 - 55 (BBCH). Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55-59 (H), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1000 l/ha (base per il calcolo). Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). Le colture intercalari e le malerbe in fiore devono essere eliminate prima del trattamento (il giorno prima sfalciare/trinciare l'erba). **Aglio, Scalogni:** 0.2 lt/ha, contro *tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Angurie, Meloni, Zucche (buccia non commestibile) (Pieno campo):** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

	Asparagi: 0.2 lt/ha, contro *Criocera a dodici punti, Criocera dell'asparago*. Applicazione: Dopo il raccolto. Al massimo 3 trattamenti per anno ad un intervallo di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Asparagi:** 0.2 lt/ha, contro *Tripidi*. Applicazione: Dopo il raccolto. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Asteraceae):** 0.2 lt/ha, contro *Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Baby-Leaf (Brassicaceae), Insalate asiatiche (Brassicacee):** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici, Minatrici, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 7 giorni. Al massimo 4 trattamenti per taglio. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Chenopodiaceae):** 0.2 lt/ha, contro *Minatrici Mosca della barbabietola*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Chenopodiaceae):** 0.2-0.4 lt/ha, contro *nottue (defogliatrici), nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 1

	settimana. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Bietola:** 0.2 lt/ha, contro *larve defogliatrici, minatrici, mosca della barbabietola*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Bietola, Spinaci (Pieno campo):** 0.2 lt/ha, contro *tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. **Carciofi (Pieno campo):** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles (Pieno campo):** 0.2 lt/ha, contro *Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni, Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 4 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 10 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cetrioli (Serra):** 0.2 lt/ha, contro *Minatrici*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Pericoloso per le api - Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cetrioli, Melanzana, Peperone, Pomodori:** 0.03-0.04% (0.3-0.4 lt/ha, contro *Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Pericoloso per le api -

	Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Cipolle, Porro:** 0.4 lt/ha, contro *minatrici, tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Crescione:** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici, Minatrici, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Erba cipollina:** 0.2 lt/ha, contro *minatrici, tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 4 trattamenti per particella e anno in questa coltura. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Erba cipollina (Pieno campo):** 0.2 lt/ha, contro *Tignola del porro*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Dallo stadio BBCH 16. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Erba cipollina (Serra):** 0.2 lt/ha, contro *Tignola del porro*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: Dallo stadio BBCH 14. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Erba di Santa Barbara vernale:** 0.2 lt/ha, contro *Altiche Meligete della colza*. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare

	in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Erbette da cucina:** 0.02% (0.2 lt/ha), contro *Altiche Crisomelidi, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Erbette da cucina:** 0.2 lt/ha, contro *minatrici, tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Fave, Piselli con baccello** (**Pieno campo**)**:** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici, Minatrici, Tripidi*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Finocchio dolce, Sedano da coste, Sedano rapa:** 0.2 lt/ha, contro *Larve defogliatrici, Minatrici, Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Indivia e cicoria da foglia** (**Pieno campo**)**:** 0.2 lt/ha, contro *Minatrici*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Insalate (Asteracee):** 0.2 lt/ha, contro *nottue (defogliatrici), nottue terricole o vermi grigi, tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo

	di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Mais dolce:** 0.2 lt/ha, contro *piralide del mais*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Applicazione: quando il volo degli adulti ha raggiunto il massimo. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). **Melanzana:** 0.005% (0.05 lt/ha), contro *dorifora della patata*. Termine d'attesa: 3 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Melanzana, Pomodori:** 0.03% (0.3 lt/ha), contro *tuta absoluta*. Termine d'attesa: 3 giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Peperone, Pomodori:** 0.04-0.08 % (0.4-0.8 lt/ha), contro *minatrici*. Termine d'attesa: 3 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Porro** (**Pieno campo**)**:** 0.2 lt/ha), contro *tignola del porro*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. **Portulaca estiva** (**Serra**)**:** 0.2 lt/ha), contro *Larve defogliatrici Minatrici*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Applicazione: Dallo stadio BBCH 13. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti a

	intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rapa di Brassica rapa e B. napus** (**Pieno campo**)**:** 0.2 lt/ha), contro *Larve defogliatrici, Mosca del cavolo*. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti a intervalli di 7 giorni. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Ravanello** (**Serra**)**:** 0.2 lt/ha), contro *larve defogliatrici, mosca del cavolo, tripidi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rucola:** 0.02 % (0.2 lt/ha), contro *altiche*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rucola:** 0.02 % (0.2 lt/ha), contro *larve defogliatrici, nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Rucola:** 0.2 lt/ha, contro *altiche Minatrici*. Termine d'attesa: 7 Giorni. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di cavoli:** 0.03-0.04 % (0.3-0.4 lt/ha), contro *altiche, cavolaie, cecidomia del cavolo, mosca minatrice della colza, nottue (defogliatrici), tignola delle Crocifere*. Termine d'attesa: 1 settimana. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori.

	Specie di cavoli: 0.2-0.36 % (12 -20ml/1000 piante), contro *mosca del cavolo*. Applicazione: per i trattamenti mediante annaffiamento di piante giovani. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Spinaci:** 0.2 lt/ha, contro *minatrici, mosca della barbabietola*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo 3 trattamenti per coltura ad un intervallo di 7 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Spinaci:** 0.2 lt/ha, contro *nottue (defogliatrici), nottue terricole o vermi grigi*. Termine d'attesa: 1 settimana. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Valerianella:** 0.03% (0.3 lt/ha), contro *minatrici*. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Valerianella:** 0.3 lt/ha, contro *Nottue (defogliatrici), Nottue terricole o vermi grigi, Tripidi*. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. **Zucche con buccia commestibile (Serra):** 0.1 lt/ha, contro *Larve defogliatrici*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti ad un intervallo di 10 giorni. Pericoloso per le api - Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Zucche con buccia commestibile (Serra):** 0.2 lt/ha, contro *Minatrici, Tripidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Trattamenti ad un intervallo di 10 giorni.

	Pericoloso per le api - Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Melanzana, Peperone, Pomodori, Cetrioli:** 0.04% (0.4 lt/ha), contro *Cimici pentatomidi*. Termine d'attesa: 3 giorni. Pericoloso per le api – Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione soltanto in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. I prodotti non sono stati testati contro le Cimici pentatomidi alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023.
Campicoltura,	**Colza:** 0.2 lt/ha, contro *meligete della colza*. Applicazione: prima dell'inizio della fioritura. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). **Frumento, Segale, Triticale:** 0.1 lt/ha, contro *criocere dei cereali*. Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH). Termine d'attesa: 6 settimane. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). **Mais:** 0.2 lt/ha, contro *piralide del mais*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Applicazione: quando il volo degli adulti ha raggiunto il massimo. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi). **Patate:** 0.05 lt/ha, contro *dorifora della patata*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. **Trifoglio per la produzione di sementi:** 0.2 lt/ha, contro *apioni dei capolini del trifoglio*. Termine d'attesa: 3 settimane. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Pericoloso per le api: non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi).

Coltivazione piante ornamentali	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 0.03-0.04% (0.3-0.4 lt/ha), contro *larve defogliatrici, tripidi*. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 0.04-0.08% (0.4-0.8 lt/ha), contro *minatrici*. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Bosso (Buxus):** 0.03-0.04% (0.3-0.4 lt/ha), contro *piralide del bosso*. Pericoloso per le api - Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata soltanto di sera, al di fuori del periodo di volo delle api. Applicazione in serre chiuse, a condizione che non siano presenti impollinatori. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG.
Modalità di azione	AUDIENZ è composto da due materie attive, Spinosyn A e Spinosyn D (o SpinosAD). Lo Spinosad è prodotto tramite un processo di fermentazione d'un batterio del suolo tale Saccharopolyspora spinosa (Actinomicete). Lo Spinosad si distingue per un nuovo modo d'azione, e non possiede resistenze incrociate con altre materie attive. La materia attiva, è assimilata per contatto e ingestione. Lo Spinosad è 5 a 10 volte più attivo tramite ingestione che per contatto. La velocità d'azione insetticida, è compatibile a quella di un insetticida di sintesi. AUDIENZ è diffuso nelle piante in maniera translaminare ma non sistemica. AUDIENZ agisce perturbando l'attività neurologica degli insetti. La materia attiva, si fissa sul recettore dell'acetilcolina (nAChR) e induce un flusso permanente di ioni di sodio (Na). Questo flusso, provoca lo scarico e una iperattività dei neuroni, poi quella dei muscoli. I sintomi caratteristici possono essere stiramenti di muscoli, dei

	tremolii, movimenti febbrili delle ali, una respirazione difficile e dei movimenti della mascella. L'effetto diventa già importante, dopo qualche ora dal trattamento. Questi sintomi sono irreversibili e portano alla paralisi e alla morte dell'insetto. La degradazione di Spinosad nell'ambiente è rapida. Essa comincia con una fotolisi, poi lo Spinosad è degradato tramite i microorganismi presenti nel terreno.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Audienz è mescolabile con i nostri fungicida. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [1,2-benzisotiazol-3(2H)-on]. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 8 Pericoloso per le api
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	500 ml, 3 lt.
®	Marchio registrato Omya Svizzera
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 26.02.25/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch