Bacchus®

Fongicide

Fongicide combiné pour la viticulture.

Produit	Bacchus est une suspension concentrée et contient 14.8% (190g/l) cuivre (sous forme d'oxysulfate) et 2.7% (35g/l) Cymoxanil. W-4878
Cultures	Viticulture.
Spectre d'efficacité	mildiou de la vigne.
Emploi Viticulture	**Vigne:** 0.3% (4.8lt/ha), contre *mildiou de la vigne*. Application: après la floraison, jusqu'à mi-août au plus tard. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Convient également au traitement par voie aérienne. Maximum 6 kg de cuivre métal par année par ha. Le bilan de cuivre métal sur 5 ans ne doit toutefois pas dépasser 20 kg/ha au maximum. Ne pas conserver le produit à des températures au-dessous de 0°C.
Mode d'action	Bacchus est la combinaison d'un produit de contact et d'un produit systémique. La matière active, cymoxanil, pénètre dans le tissu végétal et protège les parties vertes de la plante, de l'intérieur vers l'extérieur. Le sulfate de cuivre adhère à la plante et forme un revêtement de protection fongicide. Il inhibe la germination des spores et la croissance du mycélium en altérant le système respiratoire des champignons.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Bacchus est miscible avec nos fongicides et engrais foliaires. **protection de l'utilisateur:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + une visière + un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière

	avérée une protection semblable ou supérieure. Les travaux successifs dans les cultures traitées doivent avoir lieu au plus tôt 48 heures après le traitement. Ensuite, pour les 48 heures successives : porter des gants + des vêtements de protection.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	10 lt.
®	Marque déposée par Leu + Gygax AG
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09.02.26/RH/LG0000

4665 Oftringen AG, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch