**Scheda Tecnica**

# Bacchus®

**Fungicida**

## Fungicida combinato per la viticoltura.

| | |
|---|---|
| **Prodotto** | Bacchus® è una sospensione concentrata (SC) e contiene 14.8 % 190 g/l Rame (sotto forma di ossisolfato) e 2.7 % 35 g/l di Cimoxanil. W-4878 |
| **Colture** | Viticoltura |
| **Spettro di efficacia** | Peronospora della vite. |
| **Applicazione Viticoltura** | **Vite:** 0.3% (4.8 lt/ha), contro *Peronospora della vite*. Applicazione: Dopo la fine della fioritura, al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Anche per applicazione per via aerea. Non conservare il prodotto a temperature al sotto di 0°C. Al massimo 4 kg di rame-metallo per anno e per ettaro. 20 kg di rame-metallo per ettaro (bilancio del rame) nell'arco di 5 anni consecutivi. |
| **Modalità di azione** | Bacchus, è una combinazione di un prodotto di contatto e di uno sistemico. La materia attiva cymoxanil, penetra nel tessuto vegetale e protegge le parti verdi della pianta, dall'interno verso l'esterno. L'ossisolfato di rame, aderisce alla pianta e forma un rivestimento di protezione fungicida. Esso inibisce la germinazione delle spore e la crescita del micelio, alterando il sistema respiratorio del fungo. |
| **Preparazione della poltiglia** | Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.<br>**Miscibilità:** Bacchus® è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.<br>**Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di |

| | |
|---|---|
| | protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate devono essere effettuati al più presto 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. Indossare guanti + indumenti protettivi nelle 48 ore seguenti. |
| **Rotazione delle colture** | Nessuna restrizione. |
| **Classificazione** | Attenzione<br><br>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.<br>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| **Comportamento nell'ambiente** | Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate. |
| **Imballaggio** | 10 lt. |
| ® | Marchio registrato Leu+Gygax SA Svizzera |
| **Osservazioni** | Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate. |

Version 09.02.26/RH//LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch