Leu+Gygax AG

# Basfoliar®-Combi Stipp®

Concime liquido

## Concime fogliare liquido per le colture delle bacche, della frutta e dei legumi.

| | |
|---|---|
| **Prodotto** | Basfoliar®-Combi Stipp® contiene: 15% Ca, 9.0% N, 02.% B, 0.4%Mn, 0.01% Zn. |
| **Colture** | Coltivazione di bacche, Orticoltura, Frutticoltura. |
| **Spettro di efficacia** | Concime fogliare a base di calcio contro la ticchiolatura sulle foglie e la maculatura amara (bitter tip) sulle mele, come pure per migliorare la qualità dei frutti e dei legumi. |
| **Applicazione Orticoltura**<br><br>**Coltivazione di bacche** | **Pomodori:** 0.2 % (2 lt/ha), contro *la necrosi apicale*.<br>5-6 applicazioni a partire dall'inizio della fioritura.<br><br>**Peperone:** 0.3 % (3 lt/ha), contro *la necrosi apicale*.<br>5-6 applicazioni a partire dall'inizio della fioritura.<br><br>**Cetrioli:** 0.1 % (1 lt/ha), contro *la necrosi apicale*.<br>5-6 applicazioni a partire dall'inizio della fioritura.<br><br>**Insalate cappuccio, Indivia:** 0.2 % (2 lt/ha), 2 applicazioni a partire da 2 settimane dopo la piantagione.<br><br>**Specie di cavoli, Cavolo cinese:** 1.2 % (12 lt/ha) 3-5 applicazioni prima della formazione delle teste.<br><br>**Coltivazione di bacche in generale:** 0.25-0.5 % (1-2.5 lt/ha), 2-3 applicazioni, l'ultima dopo la fioritura per migliorare la qualità dei frutti e la loro conservazione.<br><br>**Uva spina:** 0.2 % (1 lt/ha), 2-3 applicazioni, l'ultima dopo la fioritura.<br><br>**Fragola:** 0.1-0.3 % (1.5-4.5 lt/ha), 2-3 applicazioni, l'ultima dopo la fioritura per migliorare il calibro, la qualità e la conservazione dei frutti. |

| | |
|---|---|
| **Frutticoltura** | **Frutta a granelli:** 0.2-0.4 % (3-6 lt/ha) contro la maculatura amara (bitter pit) 6-8 applicazioni dopo la fioritura. Al primo trattamento cominciare con la dose più debole.<br>0.2-0.25 % (3-4 lt/ha) sulle varietà più sensibili, 6-8 trattamenti dopo la fioritura.<br>0.4-0.7 % (massimo 10lt/ha) in caso di forti sospetti, 4-8 applicazioni dopo la fioritura.<br>0.2-0.25 % (3-4 lt/ha), per rimediare alla ticchiolatura sulle foglie, alla podsolizzazione e caduta delle foglie, 4-8 applicazioni dopo la fioritura.<br><br>**Ciliegio:** 0.1-0.3 % (1.5-4.5 lt/ha) contro lo spacco dei frutti. 2-3 applicazioni dopo la fioritura con un intervallo tra i trattamenti di 14 giorni. |
| **Modalità di azione** | Grazie alla sua formulazione speciale Basfoliar Combi Stipp®, previene la formazione della ticchiolatura e la podsolizzazione delle foglie, come pure la caduta prematura delle stesse. Riduce pure la maculatura amara (bitter tip) sui frutti. La sua formulazione facilmente assimilabile, lo rende facilmente disponibile attraverso le foglie e i frutti.<br>Nelle fragole, favorisce la grssezza, la durezza e lo stoccaggio delle stesse. Nelle ciliegie, riduce lo spacco dei frutti, ciò che permette una migliore stabilità sia per lo stoccaggio come pure per il trasporto. |
| **Preparazione della poltiglia** | Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione.<br>**Miscibilità:** Basfoliar®-Combi Stipp® è mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax SA |
| **Rotazione delle colture** | Nessuna restrizione. |
| **Classificazione** | Pericolo<br><br>P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.<br>EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.<br>H302 Nocivo se ingerito.<br>H318 Provoca gravi lesioni oculari.<br>P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.<br>P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.<br>P301-312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…<br>P305-351-338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a |

| | |
|---|---|
| | contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.<br>P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI e un medico…<br>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un deposito riconosciuto per lo smaltimento<br>SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. |
| **Comportamento nell'ambiente** | Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG e FiBL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate. |
| **Imballaggio** | 10 lt. 200 lt. |
| ® | Marchio registrato Compo Expert GmbH, Münster |
| **Osservazioni** | Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate. |

Version 23.11.21/RH/RF/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch