Beta Star

Erbicida

Erbicida di contatto contro le malerbe annuali

Prodotto	Beta Star è una emulsione concentrata(EC) e contiene10.1 % (100 g/l) Etofumesate, 8.08 % (80 g/l) Fenmedifam (W-6932-1)
Colture	Campicoltura, Orticoltura
Spettro di efficacia	Avena selvatica, Coda di volpe comune, Fienarola annua, Pabbio, Pennacchini, Ricacci di cereali, Sanguinella, Amaranto, Borsa pastore comune, Caglio attaccaveste, Canapetta comune, Centonchio comune, Cicuta aglina, Crespino dei campi, Erba morella, Erba storna comune, Falsa ortica, Farinello comune, Fiordaliso, Fumaria, Galinsoga, Mercorella, Nontiscordardimè, Papavero, Poligono avicolare, Poligono convolvolo, Poligono persicaria, Portulaca, Ravanello selvatico, Ricacci di colza, Ricacci di girasole, Senape dei campi, Senecione comune, Veronica, Viola dei campi.
Applicazione **Orticoltura** **Campicoltura**	**Barbabietola:**3-6lt/ha, contro *Dicotiledoni e Monocotiledoni annuali* Applicazione: Primavera, in post-emergenza. Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). **Barbabietola da foraggio, Barbabietola da zucchero:**3-6lt/ha, contro *Dicotiledoni e Monocotiledoni annuali.* Applicazione: Primavera, in post-emergenza. Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
Modalità di azione	Beta Star contiene due materie attive differenti, aventi un effetto di contatto e residuale, ciò che permette di controllare la maggior parte delle malerbe annuali. La sostanza attiva Fenmedifan è assorbita dalle foglie delle malerbe. Il calore e l'umidità elevati, accellerano l'effetto iniziale. Quanto a l'Etofumesate, possiede un effetto residuale e di contatto.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione.

Scheda Tecnica

	Miscibilità: in caso di utilizzazione in combinazione, seguite sempre le istruzioni delle etichette, dei prodotti partner. **Protezione dell'utente:** durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
Rotazione delle colture	In una normale rotazione delle colture è possibile coltivare tutte le colture.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H335 Può irritare le vie respiratorie. H351 Sospettato di provocare il cancro. H411 Tossico per gli organism acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 14.03.22/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch