Bion®

Acibenzolar-S-méthyle



- Active la force naturelle des plantes
- Longue durée d'action
- Indication contre le feu bactérien

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Cladosporiose de l'épinard, mildiou de l'épinard, mildiou de la laitue, mildiou des crucifères, oïdium des céréales, rouille blanche.
Effet partiel: rouille blanche, feu bactérien.

Mode d'action

Bion® renforce les défenses de la plante et protège ainsi contre les maladies. Bion est un produit systémique et efficace contre champignons, bactéries, virus et autres organismes nuisibles. Le mécanisme d'action est unique et comparable à une vaccination. Le produit n'a pas un effet direct sur les maladies, donc le produit doit être utilisé préventivement. Seulement 4 jours aprèsl'application l'effet protecteur se déroule.


Profil du produit

Formulation: WG - granulés à disperser dans l'eau

Matière active: Acibenzolar-S-méthyle 50 %

Classification GHE:

Attention



GHS 07 GHS 09

Miscibilité

Bion® est miscible avec nos produits phytosanitaires sauf Phytonic.

Application

Fruits à pépins:	20g/ha, contre *feu bactérien (Effet partiel).* Application: avant la floraison. Intervale entre les traitements 7-14 jours. 3 traitements au maximum par parcelle et par année avant la floraison.
Fruits à pépins:	40g/ha, contre *feu bactérien (Effet partiel).* Application: Intervale entre les traitements 7-14 jours pendant la floraison. 2 traitements au maximum par parcelle et par année pendant la floraison.
Fruits à pépins:	40g/ha, contre *feu bactérien (Effet partiel).* Application: Intervale entre les traitements 7-14 jours après la floraison (à partir de BBCH 70). Délai d'attente: 3 semai nes. 2 traitements au maximum par parcelle et par année après la floraison.
Baby-Leaf (Chenopodiaceae):	0.002-0.006% (20-60 g/ha), contre *cladosporiose de l'épinard, mildiou de l'épinard.* Délai d'attente: 1 semaine. 4 traitements au maximum par culture.
Laitues pommées:	0.006% (60 g/ha), contre *le mildiou de la laitue.* Délai d'attente: 1 semaine. 4 traitements au maximum par culture.
Radis de tous les mois:	30-60 g/ha, contre *mildiou des crucifères.* Effet partiel: rouille blanche. Délai d'attente: 1 semaine. 1 traitement par culture au maximum.
Epinard:	0.002-0.006 % (20-60 g/ha), contre *cladosporiose de l'épinard, mildiou de l'épinard.* Délai d'attente: 1 semaine. 4 traitements au maximum par culture.
Blé:	60 g/ha, contre *oïdium des céréales.* Application: stade 25-29 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

® Marque déposée par Syngenta AG, Bâle

Version: 04/2023

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch