Blackex

MCPA / Dicamba




- **Effet foliaire, la plante meurt jusqu'aux racines**
- **Mélange pour étaler, tamponner et pulvériser**
- **Formulation colorée en rouge**

5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d’efficacité

Rumex à feuilles obtuses, renoncule, grand plantain, pissenlit, ortie brûlant, griffe d’ours, cerfeuil etc.



Profil du produit

Formulation:	SL - concentré soluble dans l'eau
Matières actives:	MCPA 8.57 % (90 g/l) Dicamba 0.952 % (10 g/l)

Classification GHE:



GHS 09

Mode d’action

La matière active Dicamba agit sur les zones de croissance des plantes. Il a également un effet résiduel et racinaire. La matière active MCPA agit sur la zone d'étirement des adventices et conduit à un allongement irrégulier des plantes. Les deux substances stimulent les mauvaises herbes. S’en suit une croissance incontrôlée, ce qui conduit finalement à leur mort.

Application

Prairie et pâturages:	contre *les dicotylédones annuelles et vivaces.* Délai d'attente: 3 semaines. Application: mélange prêt à l'emploi pour les appareils à enduire, les dispositifs à tamponner et les pulvérisateurs. Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après le traitement. Exception: pour les animaux qui ne produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines. Traitement plante par plante. Traiter les adventices en pleine croissance avant la formation des graines.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Miscibilité

Mélange prêt à l'emploi. Il est possible de diluer le produit pour une application au pulvérisateur manuel ou porté sur le dos. (1 part de Blackex, 2 parts d'eau).

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

Version: 04/2023