Bogard®

Difénoconazole



- **large spectre**
- **action rapide avec effet à long terme**
- **activité préventive, systémique et curative**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Spectre d'efficacité

Alternariose, rouille grillagée du poirie r, maladies fongiques des feuilles, brûlure des feuill es, rouille brune, cercosporiose, oïdium, rouille jaune, gommose des cucurbitacées, cladosporiose, cloque du pêcher, anthracnose,moniliose, ramulariose, rouille des plantes ornementales, rougeot, cladosporiose, maladie criblée, pourriture noire de la vigne (black rot), septoriose, cylindrosporiose, nécrose du collet du colza, maladie des taches noires du rosier.



Profil du produit

Formulation: EC - Cconcentré émulsifiable

Matière active: Difénoconazole 23.5% (250 g/l)

Classification GHE:

Danger



GHS 07 GHS 08 GHS 09

Mode d'action

La matière active du produit Bogard®, le Difénoconazole, fait partie du groupe triazoles. Le mode d'action consiste en lasuppression de la synthèse des stéroles. Le Difénoconazole interfère directement sur la croissance du tube germinatif et la croissance des hyphes des champignons. Plus tard les structures de ceux-ci s'effondrent, ce qui empêchera les champignons de se propager.

Application

Baies:	0.05 % (0.5 lt/ha), contre *l'oïdium, rouille.*
Arboriculture:	0.24-0.48 lt/ha, contre *l'oïdium, rouille, maladie criblée des prunus, moniliose des fleurs, des rameaux et des fruits, rouille grillagée du poirier, tavelure, cylindrosporiose, cloque du pêcher.*
Viticulture:	0.0125 %, contre *l'oïdium de la vigne, rougeot, black-rot.*
Cultures maraîchères:	0.05 % (0.5 lt/ha), contre *alternarioses, l'oïdium, puccinia spp., anthracnose, gommose des cucurbitacées, taches pourpres, rouille, cladosporiose, cercosporiose et ramulariose, maladies fongiques des feuilles, septoriose, brûlure des feuilles.*
Grandes cultures:	0.5 lt/ha, contre *cercosporiose et ramulariose, alternariose, nécrose du collet du colza, rouille brune, l'oïdium des céréales, rouille jaune.*
Cultures ornementales:	0.05 %, contre *maladies fongiques des feuilles, moniliose des fleurs et des rameaux, oïdiums des plantes ornementales, rouilles des plantes ornementales, maladie des taches noires du rosier.*

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Mischbarkeit

Bogard® est miscible avec nos fongicides, insecticides et engrais foliaires.
Utiliser immédiatement les bouillies.

® Marque déposée par Syngenta SA, Bâle

Leu+Gygax SA
5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch