Scheda Tecnica

Bogard®

Fungicida

Fungicida molto efficace con effetto sistemico e di lunga durata contro le malattie in frutticoltura, viticoltura, orticoltura, campicoltura e piante ornamentali.

Prodotto	Bogard è un'emulsione concentrata (EC) e contiene 23.5 % (250 g/lt) Difenoconazolo. (W-5056-1)
Colture	Campicoltura, Coltivazione di bacche, Coltivazione piante ornamentali, Frutticoltura, Orticoltura, Viticoltura.
Spettro di efficacia	Marciume della lattuga, Altenariosi delle carote, Alternaria spp., Alternariosi (Alternaria porri), Alternariosi delle solanacee, Bolla del pesco, Bruciatura delle foglie dell'asparago, Cancro gommoso [Cancro gommoso (Didymella bryoniae)], Cercosporiosi e ramulariosi, Cilindrosporiosi del ciliegio, Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, cladosporiosi delle cucurbitacee, Maculature fogliari, Marciume da phoma delle crocifere, Marciume della lattuga, Marciume nero, Monilia dei frutti, Monilia dei rami e dei fiori, Necrosi fogliare del prezzemolo, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Oidio (diverse specie) su valerianella, Oidio dei cereali, Oidio della fragola, Oidio della mela/pera, Oidio della pesca, Oidio della vite, Oidio dell'albicocca, Oidio delle Asteracee, Oidio delle Cucurbitacee, Oidio delle rose, Oidio delle solanceae, Oidio delle varietà di ribes, Rossore parassitario, Ruggine bruna, Ruggine del lampone, Ruggine del pero, Ruggine del susino, Ruggine dell'asparago, Ruggine delle Agliacee Puccinia allii), Ruggine fogliare (Puccinia spp.), Ruggine gialla, Ruggini su piante ornamentali, Septoriosi del pomodoro/della melanzana, Septoriosi del sedano, Ticchiolatura della frutta a granella, Ticchiolatura della rosa, Vaiolatura della frutta a nocciolo.
Applicazione Coltivazione di bacche	**Fragola:** 0.05% (0.5 lt/ha), contro *Oidio della fragola*. La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio dalla piena fioritura all'inizio

Frutticoltura	dell'arrossamento dei frutticini, 4 piante/m². Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo.  **Lampone:** 0.05% (0.5 lt/ha), contro *Ruggine del lampone*. La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. Soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto. Per i lamponi estivi e le more la dose per trattamento indicata si riferisce allo stadio dall'inizio della fioritura alla piena fioritura, volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per i lamponi autunnali la dose per trattamento si riferisce allo stadio di inizio germogliamento delle gemme dormienti a inizio fioritura, volume fogliare 7'500 m³/ha. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. **Specie di ribes:** 0.05% (0.5 lt/ha), contro *Oidio delle varietà di ribes*. La concentrazione indicata si riferisce a una quantità d'acqua di base di 1000 l/ha. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. Soltanto prima della fioritura e dopo il raccolto. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce allo stadio di allegagione al 50 - 90%, volume fogliare di 7'500 m³/ha. **Albicocco, Pesco/pesco noce:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Monilia dei frutti, Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dal germogliamento. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Trattamento contro la botrite durante la fioritura. Solo in combinazione con Captan (80 % WG), conc. 0.1%. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS).

	Albicocco: 0.02% (0.32lt/ha), contro *Monilia dei frutti Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dal germogliamento. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Trattamento contro la muffa grigia durante la fioritura. Solo in combinazione con Captan (80 % WG), conc. 0.1%. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 60 m rispetto alle acque di superficie. Applicazione per via aerea. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). **Albicocco, Pesco/pesco noce:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Oidio dell'albicocca, Oidio del pesco*. Termine d'attesa: 3 Settimane Applicazione: Dopo la fioritura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Solo in combinazione con Captan (80 % WG), conc. 0.1%. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). **Ciliegio, Prugno/Susino:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Cilindrosporiosi del ciliegio, Monilia dei frutti, Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dal germogliamento. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Trattamento contro la muffa durante la fioritura. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). Soltanto in combinazione con Malvin WG 0.1% (1.6 kg/ha) o con 336 g Ditianon per ha con un prodotto contenente la sostanza attiva Ditianon. **Frutta a granelli:** 0.015% (0.24 lt/ha), contro *Monilia dei rami e dei fiori, Oidio della mela/pera, Ruggine del pero, Ticchiolatura della frutta a granelli*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dal germogliamento al più tardi entro fine luglio. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di

	riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Trattamento contro la muffa durante la fioritura. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). Soltanto in combinazione con Captano WG 0.1% (1.6 kg/ha) o con 336 g Ditianon per ha con un prodotto contenente la sostanza attiva Ditianon. **Pesco/pesco noce:** 0.03% (0.48 lt/ha), contro *Bolla del pesco*. Applicazione: Dal germogliamento fino alla fioritura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). **Pesco/pesco noce:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Bolla del pesco*. Applicazione: Dall'inizio della fioritura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). **Prugno/Susino:** 0.02% (0.32 lt/ha), contro *Ruggine del susino*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dopo la fioritura. per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). Soltanto in combinazione con Captano WG 0.1% (1.6 kg/ha) o con 336 g Ditianon per ha con un prodotto contenente la sostanza attiva Ditianon.

Viticoltura	**Vite:** 0.0125%, contro *Marciume nero, Oidio della vite, Rossore parassitario*. Applicazione: Al più tardi entro metà agosto. Contro il rossore parassitario in combinazione con Folpet (80% WP), conc. 0.1%. Applicazione per via aerea. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS).Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 60 m rispetto alle acque di superficie. **Vite:** 0.0125%, contro *Marciume nero, Oidio della vite, Rossore parassitario*. Applicazione: Al più tardi entro metà agosto. Contro il rossore parassitario in combinazione con Folpet (80% WP), conc. 0.1%. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS).
Orticoltura	**Aglio, Cipolle, Scalogni:** 0.5 lt/ha, contro *Alternariosi, Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii)*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Asparagi:** 0.5 lt/ha, contro *Bruciatura delle foglie dell'asparago, Ruggine dell'asparago*. Applicazione: In estate. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. **Barbabietola:** 0.5 lt/ha, contro *Cercosporiosi e ramulariosi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo.

	Carote: 0.5 lt/ha, contro *Altenariosi delle carote*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo.  **Cetrioli:** 0.5 lt/ha, contro *Cancro gommoso (Didymella bryoniae)*. Termine d'attesa: 3 giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. **Cicoria belga [produzione delle radici]:** 0.5 lt/ha, contro *Alternaria spp., Oidio delle Asteracee, Ruggine fogliare (Puccinia spp.)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. Al massimo un trattamento per coltura. **Erba cipollina:** 0.5 lt/ha, contro *Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. **Erbette da cucina:** 0.5 lt/ha, contro *Maculature fogliari*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. **Finocchio dolce:** 0.5 lt/ha, contro *Cercosporiosi e ramulariosi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo.

	Indivia e cicoria da foglia, Insalate cappuccio: 0.5 lt/ha, contro *Marciume della lattuga*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. **Indivia e cicoria da foglia:** 0.5 lt/ha, contro *Oidio delle Asteracee*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Dall'apparizione dei primi sintomi. Applicazione: Entro una settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. **Insalate a foglie (Asteracee) (Pino campo):** 0.5 lt/ha, contro *Marciume della lattuga*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 14 giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Pastinaca:** 0.5 lt/ha, contro *Maculature fogliari*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo.  **Pomodori:** 0.05 %, contro *Alternariosi delle solanacee, Oidio delle solanceae, Septoriosi del pomodoro/della melanzana*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. **Porro:** 0.5 lt/ha, contro *Alternariosi (Alternaria porri), Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Ruggine delle Agliacee (Puccinia allii)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi

	acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Prezzemolo:** 0.5 lt/ha, contro *Alternaria spp., Necrosi fogliare del prezzemolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Applicazione: Entro 1 settimana dal taglio. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Rabarbaro:** 0.5 lt/ha, contro *Maculature fogliari*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Sedano:** 0.5 lt/ha, contro *Septoriosi del sedano*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Specie di cavoli:** 0.5 lt/ha, contro *Maculature fogliari*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Valerianella:** 0.5 lt/ha, contro *Oidio (diverse specie) su valerianella*. Applicazione: Prima o immediatamente dopo la piantagione, al più tardi allo stadio di 4 foglie. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. **Zucche con buccia commestibile:** 0.5 lt/ha, contro *Alternariosi delle solanacee, cladosporiosi delle cucurbitacee, Oidio delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno

Campicoltura	per particella con prodotti contenenti Difenoconazolo. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. **Bietola:** 0.5 lt/ha, contro *Cercosporiosi e ramulariosi*. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all`anno per particella con un prodotti contenenti Difenoconazolo. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Durante la preparazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera. Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025. **Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 0.5 lt/ha, contro *Cercosporiosi e ramulariosi*. Di regola solamente 1 trattamento a inizio infestazione. **Colza:** 0.5 lt/ha, contro *Marciume da phoma delle crocifere*. Applicazione: Stadi 20-27 (BBCH). Al massimo 1 trattamento per anno. **Frumento:** 0.5 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla*. Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH). Al massimo 1 trattamento per anno. **Patate:** 0.5 lt/ha, contro *Alternariosi delle solanacee*. Applicazione: Stadi 32-61 (BBCH). Al massimo 1 trattamento per anno. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: A partire dall'inizio dell'attacco. Per evitare l'insorgenza di resistenze al massimo 4 trattamenti per particella e anno con prodotti del gruppo di principi attivi FRAC G1 (inibitori della sintesi degli steroli; ISS). Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce.
Coltivazione piante ornamentali	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 0.05 %, contro *Maculature fogliari, Monilia dei rami e dei fiori, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 10-14 giorni. Per

	proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo. **Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 0.05 %, contro *Maculature fogliari,Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 10-14 giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo. **Rose:** 0.05 %, contro *Oidio delle rose, Ticchiolatura della rosa*. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni dell'UFAG. per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Se necessario ripetere l'applicazione dopo 10-14 giorni. Per proteggere gli organismi del suolo applicare al massimo 3 trattamenti all'anno per particella senza superare un totale di principio attivo di 500 g di Difenoconazolo.
Modalità di azione	La materia attiva del prodotto Bogard, il difenoconazolo, fa parte del gruppo dei triazoli. Il modo di azione consiste nella soppressione della sintesi degli steroli. Il difenoconazolo agisce sullo sviluppo del tubo di germinazione e le ife. Più tardi, la struttura del fungo si decompone, ciò blocca lo sviluppo della malattia da lui provocata.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi colmare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Mescolabilità:** Bogard è mescolabile con i nostri fungicidi e concimi fogliari. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare occhiali di protezione o una visiera.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Pericolo 

	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	Marchio registrato da Syngenta SA
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni.

Version 25.02.25/RH/RF/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch