Fiche technique

Bolero®

Herbicide

Herbicide à large spectre d'efficacité pour la lutte contre les mauvaises herbes dans les grandes cultures et les cultures maraîchères.

Produit	Bolero est une concentré soluble dans l'eau et contient 3.71 % (40 g/l) Imazamox. W-6099-2
Cultures	Culture maraîchère, Grande culture.
Spectre d'efficacité	Boléro est efficace contre amarantes, chénopodes, renouées, moutardes des champs, ravenelles, capselles bourse à pasteur, orties royales, morelles noires, mourons des oiseaux et autres. Efficacité partielle contre camomilles, pensées des champs.
Emploi **Culture maraîchère**	**Haricots, Pois écossés:** 1 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles*. **Chicorée witloof (chicorée-endive) [Production de racine]:** 1 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles*. Application: BBCH 12–14. Traitement fractionné (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée par parcelle et par année). Il y a un danger de ralentissement temporaire de la croissance des végétaux suite au traitement herbicide. Homologation en cas de situation d'urgence, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010, qui est autorisée temporairement jusqu'au 31 octobre 2025.
Grande culture	**Féverole, Pois protéagineux, Soja:** 1 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles*.
Mode d'action	Bolero est un herbicide hautement actif du groupe des imidazolinones. La matière active, Imazamox, est absorbée par les feuilles et les racines des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qui germent après l'application, absorbent le produit par les racines. Dans la plante, la matière active est transportée dans les zones de croissance des feuilles et des racines. Elle inhibe la formation des aminoacides, essentiels au développement et la division des cellules. Les mauvaises herbes sensibles cessent leur croissance juste après le traitement et dépérissent ensuite.

Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** En post-émergence précoce, Boléro est miscible avec Effican. Observer la tolérance culturale de l'Effican SG. En pré-émergence, Boléro est miscible avec Frontier X2 dans les cultures de soja, féveroles ou haricots. **Protection de l'utilisateur:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection.
Rotation des cultures	**Assolement:** Après une culture normale, il est possible de mettre du blé, de l'orge, des choux, des salades, des betteraves, du maïs ou des mélanges trèfles/graminées. Après un labour prématuré, il est possible de semer des légumineuses.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient [*Sorbitan, monododecanoate, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on*]. Peut produire une réaction allergique. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt.
®	Marque déposée par BASF Ludwigshafen, BRD
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 20.02.25/RH/LG0774

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch

