Scheda Tecnica

Bolero®

Erbicida

Erbicida a largo spettro d'efficacia per la lotta contro le malerbe dicotiledoni e le graminacee in campicoltura e nelle colture orticole.

Prodotto	Bolero® è un concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 3.71 % (40 g/l) Imazamox. W-6099-2
Colture	Campicoltura, Orticoltura.
Spettro di efficacia	Vengono catturati l'amaranto, farinello varie specie, persicaria, senape selvatica, ravanello selvatico, borsa del pastore, canapetta comune, erba morella, centocchio colza e.c.c. Effetto moderato contro camomilla e le viole.
Applicazione **Orticoltura** **Campicoltura**	**Fagioli, Piselli senza baccello:** 1 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali*. **Cicoria belga[Produzione di radici]:** 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe). Applicazione: BBCH 12–14. Trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato per anno e particella). Sussite il rischio d'inibizione temporanea della crescita in seguito al trattamento erbicida.* Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025. **Fava, Pisello proteico, Soia:** 1 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali*.
Modalità di azione	Bolero® è un erbicida altamente attivo del gruppo delle imidazoline. La materia attiva Imazamox, è assorbita tramite le foglie e le radici delle malerbe. Le malerbe che germinano dopo l'applicazione, assorbono il prodotto tramite le radici. Nella pianta, la materia attiva, è trasportata nella zona di crescita delle foglie e delle radici. Essa inibisce la formazione degli aminoacidi, essenziali allo sviluppo e alla divisione delle cellule. Le malerbe sensibili, sospendono la loro crescita subito dopo il trattamento e di seguito deperiscono.

Scheda Tecnica

Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Per l'applicazione postemergenza Bolero è miscibile con Effican. Fare caso nella compatibilità culturale di Effican. Usato in pre-emergenza, Bolero può essere mescolato con Frontier X2 nella soia, fagioli o fagiolini. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.
Rotazione delle colture	Dopo un periodo di coltivazione normale, il grano invernale, l'orzo invernale, il cavolo, la lattuga, la barbabietola da zucchero, il mais o il trifoglio possono essere coltivati dopo l'aratura. In caso di aratura precoce, i legumi possono essere coltivati dopo l'aratura.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt
®	Marchio registrato BASF Ludwigshafen, BRD
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 20.02.25/RH/RF/LG0774

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch