Leu+Gygax AG

Booster™

Fungicida

Fungicida contro la peronospora della vigna, la ticchiolatura delle mele e contro la peronospora nelle colture orticole e nelle fragole.

Prodotto	Booster™ è un concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 51.7 % (755 g/l) fosfonato di potassio. (W-6841-1)
Colture	Coltivazione di bacche, Orticoltura, Frutticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Fitoftora della fragola, Marciume delle fragole, Marciume radicale della fragola, Marciume radicale del lampone, Peronospora della mora, Ticchiolatura della frutta a granelli, Peronospora della vite, Peronospora della lattuga, Peronospora del carciofo, Peronospora delle Cucurbitacee, Peronospora della lattuga, Pythium spp., Peronospora della melanzana, Peronospora del peperone, Malattie causate da funghi patogeni del suolo, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali.
Applicazione Coltivazione di bacche	**Fragola:** 5 lt/ha, contro *Fitoftora della fragola, Marciume delle fragole, Marciume radicale della fragola*. Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto. Annaffiare. Al massimo in tutto 3 trattamenti per irrorazione e per annaffiamento per coltura e anno. **Fragola:** 0.5% (5 lt/ha), contro *Marciume delle fragole* (Azione parziale). Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: per irrorazione. Al massimo in tutto 3 trattamenti per irrorazione o per annaffiamento della coltura e per anno. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni dell'UFAG. **Lampone:** 0.4% (4 lt/ha), contro *Marciume radicale del lampone*. Applicazione: Prima della fioritura o dopo il raccolto Annaffiare o irrorare. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Per i

	lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Mora:** 0.4% (4 lt/ha), contro *Peronospora della mora*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Applicazione: Applicazione per irrorazione. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Frutticoltura	**Melo, Pero / Nashi:** 0.2 % (3.2lt/ha), contro *Ticchiolatura della frutta a granelli* (Azione parziale). Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: per irrorazione. A partire dallo stadio 76-89 (BBCH) fino a 2 settimane prima del raccolto. Al massimo 6 trattamenti per particella e per anno. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. **Melo, Pero / Nashi:** 0.2 % (3.2lt/ha), contro *Ticchiolatura della frutta a granelli* (Azione parziale). Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: dal germogliamento. Applicazione per irrorazione. Al massimo 6 trattamenti per particella e per anno. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG.
Viticoltura	**Vite:** 0.2 % (3.2lt/ha), contro *Peronospora della vite* (Azione parziale). Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Applicazione per irrorazione. Al massimo 6 trattamenti per particella e per anno. Anche per applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG.
Orticoltura	**Baby-Leaf (Asteraceae):** 3 lt/ha, contro *Peronospora della lattuga*. Termine d'attesa: 14 giorni. Applicazione: per irrorazione. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni.

Coltivazione piante ornam.	Al massimo 4 trattamenti per coltura. **Carciofi:** 3.5 lt/ha, contro *Peronospora del carciofo*. Termine d'attesa: 3 settimane. Applicazione: per irrorazione. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). **Cetrioli:** 0.35% (3.5 lt/ha), contro *Peronospora delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: in caso di rischio d'infestazione. Applicazione per irrorazione. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). **Cicoria belga:** 3.5 lt/ha, contro *Peronospora della lattuga*, *Pythium spp.*. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. Al massimo 4 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). **Insalate (Asteracee):** 3 lt/ha, contro *Peronospora della lattuga*. Termine d'attesa: 14 Giorni. Applicazione: per irrorazione. Trattamenti ad un intervallo di 7 - 10 giorni. Al massimo 4 trattamenti per coltura. **Melanzana:** 4 lt/ha, contro *Peronospora della melanzana*. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). Al massimo 5 trattamenti per coltura. **Peperone:** 4 lt/ha, contro *Peronospora del peperone*. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). Al massimo 5 trattamenti per coltura. **Zucche (buccia non commestibile):** 3.5 lt/ha, contro *Peronospora delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 15 giorni. Applicazione: per irrorazione. Al massimo 3 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 5 lt/ha, contro *Malattie causate da funghi patogeni del suolo* (Azione parziale). Applicazione: annaffiare. Al massimo 6 trattamenti per particella e per anno. Prima applicazione: alla piantagione. **Colture da fiore e piante verdi:** 0.5%, contro *Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali*. Applicazione: per irrorazione. Al massimo 6 trattamenti per coltura e per anno.

Scheda Tecnica

Modalità di azione	Booster, è un fungicida sistemico. Il suo effetto, si manifesta contro le seguenti malattie di differenti colture: il deperimento delle radici, il marciume radicale delle fragole, la peronospora delle fragole, la peronospora delle colture orticole, la peronospora della vite (effetto parziale) e contro la ticchiolatura delle mele. La materia attiva, il fosfonato di potassio, fa parte della famiglia chimica dei fosfonati. Essa, è assorbita dalle foglie e di seguito trasportata rapidamente in tutta la pianta. Così, Booster protegge la pianta come pure i nuovi germogli. Booster ha la capacità d'eliminare le spore del fungo infestante e di perturbare lo sviluppo del micelio. In più, il trattamento stimola il sistema immunitario delle piante.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Booster può essere miscelato con i nostri insetticidi. Per miscele, aggiungere sempre Booster come ultimo prodotto nel serbatoio di irrorazione.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H315 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER. Le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 18.03.24/RH/RF/LG1169

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch