Scheda Tecnica

Leu+Gygax AG

Booster SF

Fungicida

Fungicida contro la peronospora della vite.

Prodotto	Booster SF è una sospensione concentrata (SC); contiene 672 g/l di fosfonato di potassio e 300 g/l Folpet. W-7163
Colture	Viticoltura
Spettro di efficacia	Peronospora della vite, Azione parziale: Marciume grigio (Botrytis cinerea), Effetto secondario: Rossore parassitario.
Applicazione Viticoltura	**Vite:** 0.25% (4 lt/ha), contro *Peronospora della vite. Marciume grigio (Botrytis cinerea)* (Azione parziale), *Rossore parassitario* (Effetto secondario). Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Non conservare il prodotto a temperature al sotto di 0°C. Effettuare al massimo 6 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti potassio fosfato bibasico anidro. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Vite:** 0.25% (4 lt/ha), contro *Peronospora della vite. Marciume grigio (Botrytis cinerea)* (Azione parziale), *Rossore parassitario* (Effetto secondario). Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Non conservare il prodotto a temperature al sotto di 0°C. Effettuare al massimo 6 trattamenti per anno e particella con prodotti contenenti potassio fosfato bibasico anidro.

	Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una distanza minima pari a 60 m rispetto alle acque di superficie.
Modalità di azione	**Booster SF**, è un prodotto combinato composto da due principi attivi. Uno, il Folpet, fa parte della famiglia chimica dei ftalimmidi. Esso impedisce lo sviluppo delle spore e del micelio di alcune micose. Folpet è un fungicida di contatto multisito e cioé esso attacca il parassita in diversi punti. Fino ad ora, il Folpet non ha provocato delle resistenze e per questo è evidente che una combinazione con il secondo principio, il fosfonato di potassio, il quale è presente nel Booster SF conviene perfettamente alla lotta contro la peronospora della vigna, rinforzando l'effetto contro la stessa. La seconda materia attiva, fa parte della famiglia chimica dei fosfonati. Essa è assorbita dalle foglie e di seguito trasportata rapidamente in tutta la pianta. Cosi, Booster SF protegge la pianta, come pure i nuovi germogli. Booster SF, ha la capacità di eliminare le spore del fungo infestante e di perturbare lo sviluppo del micelio. In più, il trattamento stimola il sistema immunitario delle piante.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Booster SF è mescolabile con i nostri insetticidi. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate devono essere effettuati al più presto 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. Indossare guanti + indumenti protettivi nelle 48 ore seguenti.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 Sospettato di provocare il cancro. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo

	imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 13.03.25RH/RF/LG1061

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch