Caravel

erbicida

Erbicida per colture da campo e ortaggi.

Prodotto	Caravel è uno sospensione di capsule (CS) e contiene 31.03 % (360 g/l) Clomazone, Coformulante da dichiarare separatamente: Nitrato di sodio, Cloruro di calcio. (W-7168-2)
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G).
Spettro di efficacia	cencio molle, forbicina, farinello, galinsoga, attaccamano, poligono, porcellana, erba morella, stramonio, girasole, senecione, centocchio, erba miseria asiatica (Commelina), miglio (Setaria, Digitaria, Echinochloa, Panicum, Sorghum).
Applicazione Orticoltura (G)	**Aneto, Coriandolo, Levistico:** 0.15 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*, *Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: in pre-emergenza (BBCH 01-08). Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. In varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Asparagi [Piantagioni in produzione]:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*, *Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Asparagi [Giovani piantagioni]:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*, *Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Durante l'anno di piantagione. Prima dell'emergenza dal terreno dei turioni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Carote:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*, *Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Rischio di clorosi temporanea della foglia. Non trattare in semine autunnali e invernali per la produzione di primizie.

	Fagioli: 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. In combinazione con 2.0 l/ha Successor 600. **Fave:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. Non usare nella la produzione die sementi. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Finocchio dolce [piantato]:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Rischio di clorosi temporanea della foglia. Trattamento quando le piante sono diventate resistenti. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Finocchio dolce [seminato]:** 0.2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. Termine d'attesa: 60 Giorni. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. **Patata dolce:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione. Rischio di clorosi temporanea della foglia. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. **Piselli con baccello:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. Non usare nella la produzione die sementi. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Prezzemolo:** 0.15 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Termine d'attesa: 90 Giorni. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

	Prezzemolo tuberoso [Uso della radice] (Pieno campo): 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale.Rischio di clorosi temporanea della foglia. Non trattare in semine autunnali e invernali per la produzione di primizie. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rabarbaro:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In primavera. Prima del germogliamento. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rapa di Brassica rapa e B. napus:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Scorzonera:** 0.15 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Termine d'attesa: 90 Giorni. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Sedano da coste:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Sedano rapa:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Specie di cavoli:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Prima o immediatamente dopo la piantagione. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Rischio di clorosi temporanea della foglia.

Campicoltura (F)	**Spinaci:** 0.15 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Rischio di clorosi temporanea della foglia. Per gli spinaci invernali coltivati su suoli sabbiosi, nell'anno della raccolta sussiste un rischio di clorosi della foglia e d'inibizione temporanea della crescita. **Zucca da olio:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. In combinazione con 2.0 l/ha Successor 600. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. **Zucche (buccia non commestibile):** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Prima o immediatamente dopo la piantagione. Non trattare in colture sotto copertura di tessuto non tessuto. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Zucchine** (**Pieno campo**)**:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione (fino allo stadio 16 BBCH). Non applicare su colture con foglio di pacciamatura. Nel caso di un trattamento in colture sotto copertura di tessuto non tessuto vi è il pericolo di danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 0.2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Trattamtno frazionato conformemente alle indicazioni del titolare dell'autorizzazione (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). **Colza:** 0.2 - 0.33 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Autunno, in pre-emergenza. **Fava:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

	Lupini: 0.3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, fino a 3 giorni dopo la semina. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Papavero:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Patate:** 0.2 - 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. In combinazione con 0.5 kg/ha Dancor 70 WG. **Pisello proteico:** 0.2 - 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. In combinazione con 2.0 l/ha Successor 600. **Riso seminato su terreno asciutto:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza, immediatamente dopo la semina. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Soia:** 0.2 - 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. In combinazione con 2.0 l/ha Successor 600. **Tabacco:** 0.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente dopo la piantagione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Modalità di azione	La sostanza attiva clomazone appartiene alla famiglia degli isoxazolidinoni e viene assunta dalle erbe infestanti durante la germinazione attraverso le radici e i germogli. Dopo l'assorbimento, la sostanza attiva si distribuisce rapidamente in tutta la pianta. Nella pianta, il clomazone impedisce la sintesi della clorofilla. Le erbe infestanti non emergono più o mostrano un forte scolorimento quando emergono e muoiono.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Se utilizzato in combinazione con altri prodotti, seguire sempre le istruzioni sull'etichetta dei prodotti partner. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.

Rotazione delle colture	Dopo un normale raccolto, qualsiasi coltura può essere ripiantata.
Classificazione	P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	0.5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 07.03.25/RH//LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch