# Comfort™

**Spiroxamine / Prothioconazole**



- **Einsetzbarkeit während der gesamten Wachstumsperiode**
- **lang anhaltende und sichere Wirkung**
- **sehr breites Wirkungsspektrum**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
**www.leugygax.ch**

Leu+Gygax AG

## Wirkungsspektrum

Ährenfusariosen, Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Halmbruchkrankheit des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum), Sprenkelnekrosen (PLS), Sprenkelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste.

## Wirkungsweise

Comfort™ ist ein kombiniertes Fungizid mit den Wirkstoffen Prothioconazole (Triazolinthione) und Spiroxamine (Spiroketalamine). Die unterschiedliche Wirkungsweise der beiden Wirkstoffe sowie ihre systemischen Eigenschaften sichern eine breite, über mehrere Wochen andauernde Wirkung gegen die wichtigsten Fuss, Blatt- und Ährenkrankheiten an Weizen, Gerste, Triticale und Roggen. Comfort™ wirkt sowohl vorbeugend wie auch abstoppend gegen verschiedene pilzliche Schaderreger und sichert gleichzeitig ein effektives Antiresistenzmanagement.


## Produkteprofil

Formulierung: EC - Emulsionskonzentrat

Wirkstoffe: Spiroxamine 30.5 % 300 g/l
Prothioconazole 16.3 % 160 g/l

GHS-Einstufung:

Achtung



GHS 07 GHS 09

## Mischbarkeit

Comfort™ ist gemäss L+G Ratgeber mischbar.

## Anwendung

| | |
|---|---|
| **Gerste:** | 1.25 lt/ha, gegen *Echter Mehltau des Getreides, Netzfleckenkrankheit der Gerste, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Sprenkelnekrosen (PLS+RCC), Zwergrost der Gerste.* Anwendung:Stadium 31-51 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |
| **Korn (Dinkel):** | 1.25 lt/ha, gegen *Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum).* Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |
| **Roggen:** | 1.25 lt/ha, gegen *Braunrost, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum).* Anwendung: Stadium 37-61 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |
| **Triticale, Weizen:** | 1.25 lt/ha, gegen *Ährenfusariosen.* Anwendung: Stadium 55-69 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |
| **Triticale:** | 1.25 lt/ha, gegen *Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum).* Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |
| **Weizen:** | 1.25 lt/ha, gegen *Braunrost, Echter Mehltau des Getreides, Gelbrost, Septoria-Blattdürre (S. tritici oder S. nodorum), Septoria-Spelzenbräune (S. nodorum), Sprenkelnekrosen (PLS).* Anwendung: Stadium 31-61 (BBCH). Maximal 1 Behandlung pro Kultur. |

Leu+Gygax AG

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produktinformationen lesen.

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch