Scheda Tecnica

Comfort™

Fungicida

Fungicida sistemico combinato per la lotta contro le malattie dei cereali.

Prodotto	Comfort™ è un concentrato emulsionato (EC) e contiene 30.5 % (300 g/l) Spiroxamina, 16.3 % (160 g/l) Protioconazolo. (W-6392-1)
Colture	Campicoltura
Spettro di efficacia	Bruciature fogliari (PLS + RCC), Bruciature fogliari (PLS), Fusariosi della spiga, Macchie reticolate dell'orzo, Mal del piede dei cereali, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Ruggine nana dell'orzo, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum).
Applicazione Campicoltura	**Frumento:** 1.25 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS), Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi della spiga (S. nodorum), Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. PLS = Physiological Leaf Spots. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Frumento, Triticale:** 1.25 lt/ha, contro *Fusariosi della spiga*. Applicazione: Stadi 55 - 69 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

	Frumento: 1.25 lt/ha, contro *Mal del piede dei cereali*. Applicazione: Stadi 30 - 32 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Orzo:** 1.25 lt/ha, contro *Bruciature fogliari (PLS + RCC), Macchie reticolate dell'orzo, Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine nana dell'orzo*. Applicazione: Stadi 31-51 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. PLS+RCC = Physiological Leaf Spots e Ramularia collo-cygni. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Segale:** 1.25 lt/ha, contro *Rincosporiosi, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 37 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Trattamento in colture seminate in autunno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Spelta:** 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Ruggine bruna, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

	Triticale: 1.25 lt/ha, contro *Oidio dei cereali, Rincosporiosi, Ruggine bruna, Ruggine gialla, Septoriosi fogliare (S. tritici o S. nodorum)*. Applicazione: Stadi 31 - 61 (BBCH). Al massimo un trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Comfort™ è un fungicida combinato contenente le materie attive Prothioconazole (Triazolinthione) e Spiroxamine (Spirocetalamine). Il modo di azione differenti delle due materie attive e le loro proprietà sistemiche, assicurano un largo spettro di azione e una efficacità duratura contro le principali malattie del piede, delle foglie e delle spighe nel frumento, orzo, segale e triticale. Comfort agisce in maniera preventiva e curativa contro i differenti funghi e permette inoltre di praticare una strategia antiresistenza effettiva.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Comfort™ è mescolabile secondo le indicazioni del consulente Leu+Gygax AG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [Prothioconazol, Spiroxamin]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 + H332 Nocivo se ingerito o inalato.

	H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Version 06.02.26/RH/RF/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch