Fiche technique

Coragen ®

Insecticide

Insecticide systémique hautement actif avec une longue durée d'action pour lutter contre tous les stades des doryphores.

Produit	Insecticide liquide (SC) avec la matière active Chlorantraniliprol 18.4% (200 g/l) W-7291
Cultures	Grande culture, Culture maraîchère
Spectre d'efficacité	Tous les stades des doryphores: œufs, larves et adultes
Emploi **Grande culture**	**Pommes de terre:** 60 ml/ha, contre *doryphore*. Délai d'attente: 2 Semaine(s). Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant chlorantraniliprole plus de 2 fois par culture et au maximum tous les 2 ans sur la même parcelle.
Culture maraîchère	**Haricot non écossé:** 0,125 lt/ha, contre *Ver de la capsule (Helicoverpa armigera)*. Délai d'attente: 3 jours. Maximum 2 traitements par culture avec un intervalle de 14 jours. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant chlorantraniliprole plus de 2 fois par culture et au maximum tous les 4 ans sur la même parcelle. Homologation en cas de situation d'urgence, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010, qui est autorisée temporairement jusqu'au u 31 octobre 2025. **Pois non écossé:** 0,125 lt/ha, contre *Ver de la capsule (Helicoverpa armigera)*. Délai d'attente: 3 jours. Maximum 2 traitements par culture avec un intervalle de 14 jours. Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant chlorantraniliprole plus de 2 fois par culture et au maximum tous les 4 ans sur la même parcelle. Homologation en cas de situation d'urgence, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010, qui est autorisée temporairement jusqu'au u 31 octobre 2025.
Mode d'action	La matière active de Coragen, Chlorontraniliprol, possède un tout nouveau mode d'action qui affecte une cible biochimique différente de tous les insecticides actuels. Coragen est donc une nouvelle solution pour permettre l'alternance des familles

	chimiques dans un programme de traitement. Coragen agit surtout par ingestion mais aussi par effet contact. Chlorontraniliprol se fixe sur les récepteurs à ryanodine et provoque la libération incontrôlée des ions Ca++ et la réduction de leur stock. Les insectes ne peuvent alors plus contracter leurs muscles. Paralysés, ils arrêtent rapidement de se nourrir et entrent en léthargie avant de mourir. Coragen agit contre tous les stades de développement des doryphores.
Préparation de la bouillie	Verser la quantité mesurée de Coragen directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Coragen est miscible avec nos fongicides et engrais foliaires.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH208 Contient [Chlorantraniliprole]. Peut produire une réaction allergique. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	180 ml 500 ml
®	Marque déposée par FMC AGRO USA
A Observer	Cette fiche est pour information et ne remplace pas l'étiquette. Avant l'utilisation d'un produit, toujours lire l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 17.02.25/RH/LG1071