Cymbal® WG

Fongicide contre le mildiou



5413 Birmenstorf, Tél. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Spectre d'efficacité

Contre le mildiou de la vigne et le mildiou de la pomme de terre.

Mode d'action

La substance active cymoxanil est un fongicide à action profonde. Il a un effet préventif à court terme par un effet de contact sur les spores en germination et un effet curatif (arrêt) dans les tissus végétaux en inhibant la croissance fongique et en réduisant la formation de spores. Cymbal® WG inhibe le développement des champignons pendant l'incubation et peut ainsi stopper les nouvelles infections datant de moins de 48 heures (en particulier les infections de mildiou: Phytophtora infestans). La substance active cymoxanil est distribuée à l'intérieur de la plante de manière translaminaire (protection de la face inférieure de la feuille) et localement systémique (répartition dans la feuille traitée).

Profil du produit

Matière active:	45 % Cymoxanil
Formulation:	Granulés à disperser dans l'eau (WG)
Symbol:	 GHS07 GHS08 GHS09
	Attention
Emballage:	1 kg
Numéro fédéral d'homologation:	W 7484-2

Application

Vigne:	0.016 % (0.25 kg/ha), contre *le mildiou de la vigne*. Application: Traitements pré- et postfloraux jusqu'à mi-août au plus tard. La quantité d'application indiquée se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post-floraison) à une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de paroi foliaire de 4500 m^3 par ha. La quantité d'application doit être déterminée selon instructions du service d'homologation au volume de feuillage. Uniquement en mélange en cuve avec Folpet (0,1 %). Maximum 4 traitements par an avec des produits contenant la substance active cymoxanil.
Pommes de terre:	0.25 kg/ha contre *le mildiou de la pomme de terre.* En mélange en cuve avec 0,4 l/ha (Ibiza), délai d'attente: 2 semaines. Intervalles de traitement 7-10 jours.
Pommes de terre:	0.25 kg/ha contre *le mildiou de la pomme de terre.* En mélange en cuve avec 0.5 l/ha Ranman Top, délai d'attente: 2 semaines. Premier traitement en cas de risque d'infection ou à partir de l'avertissement du service sanitaire. Pour les pommes de terre primeur délai d'attente: 1 semaine. Intervalles de traitement: 7-10 jours.

Miscibilité

Cymbal® WG est miscible avec nos produits Ranman Top, Revus, Aviso, Audienz, Coragen et Bogard.

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Leu+Gygax SA

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch

5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45