Fiche technique

Cymbal WG

Fongicide

Fongicide partiellement systémique pour lutter contre les maladies dans les pommes de terre et la vigne.

Produit	Cymbal WG est un granulé à disperser dans l'eau (WG) et contient 45 % cymoxanil. (W-7534-2)
Cultures	Culture maraîchère, Grandes cultures , Viticulture .
Spectre d'efficacité	mildiou de la vigne, mildiou de la pomme de terre, Mildiou du pois, Mildiou de l'oignon.
Emploi **Culture maraîchère**	**Pois non écossés:** 0.25 kg/ha, contre *Mildiou du pois*. Délai d'attente: 2 semaines. 1 Traitement au maximum par culture. Le produit n'a été testé que dans un mélange en cuve dans des conditions pratiques suisses; l'efficacité sans mélange en cuve n'est donc pas garantie. Pour protéger les tierces personnes, respecter une zone tampon non traitée de 3 m le long des zones résidentielles et des installations publiques. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Information pour que des tiers ne s'introduisent pas dans la parcelle. Homologation en cas de situation d'urgence, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010, qui est autorisée temporairement jusqu'au 30 novembre 2025. **Échalote:** 0.18 - 0.25 kg/ha, contre *Mildiou de l'oignon*. Délai d'attente: 2 semaines. 2 Traitement au maximum par culture. Pour éviter le développement de résistances, lors du traitement suivant utiliser un produit qui ne contient pas de substance active du groupe FRAC no 27. Le produit n'a été testé que dans un mélange en cuve dans des conditions pratiques suisses; l'efficacité sans mélange en cuve n'est donc pas garantie. Pour protéger les tierces personnes, respecter une zone tampon non traitée de 3 m le long des zones résidentielles et des installations publiques. Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de la dérive, conformément aux instructions du service d'homologation. Information pour que des tiers ne s'introduisent pas dans la parcelle. Homologation en cas de situation d'urgence, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010, qui est autorisée temporairement jusqu'au 30 novembre 2025.

Fiche technique

Viticulture	**vigne:** 0.016% (0.25 kg/ha), contre *le mildiou de la vigne*. Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Conformément aux instructions du service d'homologation, le dosage doit être adapté au volume de la haie foliaire. Uniquement en mélange à du Folpet (0.1%). 4 traitements au maximum par année avec des produits contenant du cymoxanil.
Grande culture	**pommes de terre:** 0.25 kg/ha, contre *mildiou de la pomme de terre*. Délai d'attente:2Semaine(s). Application: traitement des feuilles. premier traitement en cas de risque d'infection ou sur conseil du service d'avertissement. 1 semaine de délai d'attente pour les pommes de terre primeurs. Intervalles de 7 à 10 jours entre les traitements. En mélange avec 0.4 l/ha Ibiza SC. **pommes de terre:** 0.25 kg/ha, contre *mildiou de la pomme de terre*. Délai d'attente: 2Semaine(s). Application: traitement des feuilles. premier traitement en cas de risque d'infection ou sur conseil du service d'avertissement. 1 semaine de délai d'attente pour les pommes de terre primeurs. Intervalles de 7 à 10 jours entre les traitements. En mélange avec 0.5 l/ha Ranman Top.
Mode d'action	L'ingrédient actif Cymoxanil est doté d'une action fongique très efficace. Il a un effet préventif à court terme en raison de l'effet contact sur la germination des spores et curatif en inhibant la croissance et le développement des spores à la surface des feuilles. Cymbal WG inhibe le développement des champignons pendant l'incubation et peut ainsi stopper les nouvelles infections datant de moins de 48 heures, notamment les attaques de mildiou (phytophtora infestans). La substance active Cymoxanil a aussi un effet translaminaire (protection de la face inférieure de la feuille) et semi systémique (diffusion dans la feuille traitée.)
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Cymbal WG est miscible avec nos insecticides et fungicides. **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + des lunettes de protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection

	semblable ou supérieure. Utilisation professionnelle: Travaux successifs: porter des gants de protection + une tenue de protection jusqu'à 48 heures après l'application du produit.
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l' OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 kg.
®	Marque déposée par Belchim Crop Protection, Belgique
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 25.02.25RH/PM/LG1135

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch