Scheda Tecnica

Cymbal® WG

Fungicida

Fungicida parzialmente sistemico contro le malattie fogliari nelle patate e in viticoltura.

Prodotto	Cymbal® WG è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 45 % Cimoxanil. (W-7534-2)
Colture	Campicoltura, viticoltura, Orticoltura.
Spettro di efficacia	Peronospora della vite, peronospora della patata, Peronospora del pisello, Peronospora della cipolla.
Applicazione Orticoltura	**Piselli con baccello:** 0.25kg/ha, contro *Peronospora del pisello*. Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Il prodotto è stato testato solo in miscela estemporanea in condizioni pratiche svizzere; l'efficacia senza miscela estemporanea non è quindi garantita. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025. **Scalogni:** 0.18 - 0.25kg/ha, contro *Peronospora della cipolla*. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per evitare l'insorgenza di resistenza, nel trattamento successivo utilizzare un prodotto che non contenga un principio attivo del gruppo FRAC No. 27. Il prodotto è stato testato solo in miscela estemporanea in condizioni pratiche svizzere; l'efficacia senza miscela estemporanea non è quindi garantita. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Informazione affinché terze persone non entrino nella particella. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 novembre 2025.

Viticoltura **Campicoltura**	**Vite:** 0.016 %, (0.25kg/ha), contro *peronospora della vite*. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Soltanto in combinazione con 0.1% di Folpet. Al massimo 4 trattamenti per anno con prodotti contenenti cimoxanil. **Patate:** 0.25kg/ha, contro *peronospora della patata*. Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: trattamento fogliare. 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme. Termine di attesa di una settimana per le patate primaticce. Intervalli di 7 - 10 giorni tra i trattamenti. In combinazione con 0.4 l/ha Ibiza SC. **Patate:** 0.25kg/ha, contro *peronospora della patata*. Termine d'attesa: 2 settimane. Applicazione: trattamento fogliare. 1° trattamento in caso di rischio di infezione risp. su segnalazione del servizio d'allarme. Termine di attesa di una settimana per le patate primaticce. Intervalli di 7 - 10 giorni tra i trattamenti. In combinazione con 0.5 l/ha Ranman Top.
Modalità di azione	La materia attiva Cymoxanil, è un fungicida con un effetto penetrante. Esso agisce brevemente e preventivamente attraverso un contatto delle spore germinate, e curativa (bloccando) nel tessuto della pianta la crescita del fungo come pure diminuendo la formazione delle spore. Cymbal WG frena la formazione del fungo durante la sua incubazione e può di conseguenza ancora bloccare infezioni fresche fino 48 ore dopo l'infezione (specialmente quelle di peronospora nelle patate). La materia attiva Cymoxanil viene suddivisa all'interno della pianta in modo translaminare (protezione della faccia inferiore della foglia) e sistemico locale (ripartita nella foglia trattata).
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Cymbal WG è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante

	l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Utilizzazione professionale: lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 kg.
®	Marchio registrato Belchim Crop Protection, Belgien
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 25.02.25/RH/RF/LG1135

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch