Fiche technique

Cyrano®

Fongicide

Fongicide combiné contre les maladies de la vigne. Effet préventif et systémique.

Produit	Cyrano est formulé comme granulé dispersible et contient 50% de Fosétyl-Al, 4% de Cymoxanil et 25% de Folpet.
Cultures	Viticulture.
Spectre d'efficacité	Mildiou, oïdium (effet partiel), rougeot (effet secondaire), pourriture grise (Botrytis sp.) (effet partiel), black-rot (effet partiel).
Emploi Viticulture	**Vigne:** 0.2-0.25% (3.2-4 kg/ha), contre *mildiou de la vigne* Effet partiel: *oïdium de la vigne. pourriture grise (Botrytis cinerea). Pourriture noire (black rot) de la vigne.* Effets secondaires: *rougeot parasitaire de la vigne*. Délai d'attente: 28 Jours. Application: traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard. Convient également au traitement par voie aérienne. La dose plus haute seulement pour les traitements par voie aérienne. Le dosage mentionné se réfère au stade BBCH 71-81 (J-M, post floraison) avec une quantité de bouillie de référence de 1600 l/ha (base de calcul) ou à un volume de la haie foliaire de 4'500 m³ par ha. Pour protéger les organismes aquatiques des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 6 m par rapport aux eaux de surface. Pour protéger des conséquences liées au ruissellement, respecter une zone tampon enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. La réduction de la zone liée à la dérive et les dérogations sont fixées dans les instructions de l'OFAG. En cas de mélange avec des produits cupriques, il existe le risque de brûlure des feuilles. Il y a lieu de consulter la titulaire de l'autorisation.
Mode d'action	La matière active Fosétyl-Al, pénètre dans les tissus des plantes, dans lesquelles il est transporté vers le bas et vers le haut. Il a une action directe sur le champignon, mais stimule aussi les capacités naturelles de défense de la vigne.

Fiche technique

	La matière active Cymoxanil est distribuée régulièrement dans la plante et agit préventivement ainsi jusqu'à 1-2 jours après une infection (effet curatif). La matière active Folpet agit par contact sur les feuilles. Le Folpet influence la respiration, inhibe la sporulation et la croissance du mycélium des champignons.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Cyrano est miscible avec Vivando. Pulvériser les bouillies à plusieurs produits sans délai. N'est pas miscible avec des produits cupriques (danger de brûlure des feuilles)
Rotation des cultures	Pas de restriction.
Classement	Attention  Tenir hors de portée des enfants. EUH 208 Contient [Folpet, Cymoxanyl]. Peut produire une réaction allergique. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H351 Susceptible de provoquer le cancer. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 kg
®	Marque déposée par Bayer AG, BRD
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 18.02.21/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch