Dexa Pro

Dünger

Kastanienholzextrakt-Lösung.

Produkt	Dexa Pro enthält Gesamtstickstoff (N): 0.7% Organische Substanz (OS): 28%. (BLW-7047)
Anwendungsbereich	Beerenbau (B), Feldbau (F), Gemüsebau (G), Obstbau (O), Weinbau (W), Zierpflanzen (Z).
Wirkungsspektrum	Produkt aus Kastanienholzextrakt zur Beeinflussung der Kationenaustauschkapazität, der Verbesserung der Salztoleranz und zur Komplexierung von Eisen gegen Chlorosen.
Anwendung **Beerenbau**	**Beerenbau allg. (Freiland):** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Beerenbau allg. (Kulturen unter Glas oder Plastik):** 0.6-0.7 lt/ 100 lt Wasser. Anwendung im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Beerenbau allg. (Tröpfchenbewässerung, Fertigation):** 0.5-1 lt/1000 m^2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen.
Feldbau	**Feldbau allg.:** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf.
Gemüsebau	**Gemüsebau allg. (Freiland):** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Gemüsebau allg. (Kulturen unter Glas oder Plastik):** 0.6-0.7 lt/ 100 lt Wasser. Anwendung im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Gemüsebau allg. (Tröpfchenbewässerung, Fertigation):** 0.5-1 lt/1000 m^2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen.
Obstbau	**Obstbau allg. (Freiland):** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf.

Weinbau **Zierpflanzenbau**	**Obstbau allg. (Kulturen unter Glas oder Plastik):** 0.6-0.7 lt/ 100 lt Wasser. Anwendung im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Obstbau allg. (Tröpfchenbewässerung, Fertigation):** 0.5-1 lt/1000 m^2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen **Reben (Freiland):** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Reben (Tröpfchenbewässerung, Fertigation):** 0.5-1 lt/1000 m^2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen **Zierpflanzen allg. (Freiland):** 0.7-1 lt/100 lt Wasser, im Minimum 4 lt/ha. Behandlungen im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Zierpflanzen allg. (Kulturen unter Glas oder Plastik):** 0.6-0.7 lt/ 100 lt Wasser. Anwendung im Abstand von 7-14 Tagen je nach Bedarf. **Zierpflanzen allg. (Tröpfchenbewässerung, Fertigation):** 0.5-1 lt/1000 m^2 je nach Bedarf mehrmals dem Giesswasser zusetzen Verträglichkeit Zierpflanzen Wegen den wechselnden Anzuchtbedingungen und der Fülle der Arten und Sorten empfehlen wir Vorversuche an einigen Pflanzen zur Abklärung der Verträglichkeit.
Wirkungsweise	Produkt aus Kastanienholzextrakt zur Beeinflussung der Kationenaustauschkapazität, der Verbesserung der Salztoleranz und zur Komplexierung von Eisen gegen Chlorosen.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die gemischten Mengen an Produkten beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Mischbarkeit:** Dexa Pro ist mit unseren Produkten gemäss L+G-Ratgeber mischbar. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanweisung einhalten; P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige

	Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1lt. 5lt.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 08.03.24/RH/LG1330

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch