Dialen ®

Herbizid

Systemisches Herbizid gegen Unkräuter inkl. Blacken und Winden im Feldbau

Produkt	Dialen ist ein wasserlösliches Konzentrat (SL) und enthält 41 % (480 g/lt) Dicamba. W-4571-2
Anwendungsbereich	Feldbau
Wirkungsspektrum	Dialen wirkt sehr gut gegen Ackerdistel, Hahnenfuss, Ackergauchheil, Kamille, Ackerspörgel, Klettenlabkraut, Ackersenf, Knötericharten, Amarant, Vogelmiere, Blacken, Wicken, Erdrauch, Winden.
Anwendung Feldbau	**Brache:** 0.5 lt/ha gegen *Ackerwinde, Rumex-Arten, Zaunwinde*. Anwendung: Bis spätestens Ende September. Nur in Tankmischung mit einem Glyphosate-Produkt. **Gerste, Weizen:** 0.25 lt/ha gegen *Dicotyledonen (Unkräuter)*. Darf nicht im Herbst angewendet werden. **Mais:** 0.6 - 0.75 lt/ha gegen *Dicotyledonen (Unkräuter)*. Splitbehandlung (angegebene Aufwandmenge entspricht total bewilligter Menge). **Mais:** 0.3 - 0. 5 lt/ha gegen *Dicotyledonen (Unkräuter)*. **Rispenhirse, Sorghum:** 0.6 lt/ha gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter)*. Anwendung: Stadium 12-18 (BBCH). Darf nicht im Herbst angewendet werden. Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. In 200 - 400 L Wasser/ha. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
Wirkungsweise	Der Wirkstoff von Dialen wird über das Blatt und teilweise auch über die Wurzel aufgenommen und mit dem Saftstrom in der Pflanze transportiert. Die Wirkung zeigt sich in einer raschen Wachstumsstockung der Unkräuter. Der Absterbeprozess kann sich über mehrere Wochen erstrecken. Der beste Bekämpfungserfolg wird bei den meisten Unkräutern im frühen Wachstumsstadium (2- bis 6-Blatt-Stadium) erzielt.

Technisches Merkblatt

Herstellung Spritzbrühe	Herstellung Spritzbrühe: Produkt direkt in den halb mit Wasser gefüllten Spritztank geben. Anschliessend mit Wasser auffüllen. Rührwerk ständig laufen lassen. **Mischbarkeit:** Dialen ist mischbar mit Glifonex TF, Landmaster Supreme 480 TF, Frontier X2. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzbrille oder Visier tragen.
Nachbau	Im Rahmen einer normalen Fruchtfolge können alle Kulturen angebaut werden. Werden Raps, Gründüngung oder eine Klee-Grasmischung als Folgekultur gesät, beträgt die Mindestwartezeit einen Monat nach einer Dialen-Behandlung. Bei vorzeitigem Umbruch ist eine Nachsaat mit Mais möglich.
Einstufung	Achtung  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLV bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	1 lt. 5 lt.
®	reg. Warenzeichen der Syngenta AG, Basel, CH
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 03.02.26/RH/LG0000

Leu+Gygax AG
4665 Oftringen AG, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch