Fiche technique

Leu+Gygax AG

Dialen®

Herbicide

Herbicide systémique contre les mauvaises herbes annuelles et vivaces dans les grandes cultures.

Produit	Dialen est un concentré soluble dans l'eau (SL) et contient 41 % (480 g/lt) dicamba. W-4571-2
Cultures	Grandes cultures.
Spectre d'efficacité	Dialen est très efficace contre Amarantes, Camomilles, Chardon des champs, Gaillet gratteron, Fumeterre, Liserons, Lampés (Rumex), Mouron des oiseaux, Mouron rouge, Renouées, Renoncule, Vesces, Séneçon, Spergule des champs.
Emploi **Grande culture**	**Blé, Orge:** 0.25 lt/ha, contre *dicotylédones*. Emploi interdit en automne. **Jachère:** 0.5 lt/ha, contre *liseron des champs, liseron des haies, rumex*. Uniquement en mélange avec un produit contenant du glyphosate. **Maïs:** 0.3-0.5 lt/ha, contre *dicotylédones*. **Maïs:** 0.6-0.75 lt/ha, contre *dicotylédones*. Traitemtent fractionné (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). **Millet, Sorgho commun:** 0.6 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles*. Emploi interdit en automne. 1 traitement par parcelle et par année au maximum. Dans 200 à 400 l d'eau/ha. Autorisé comme utilisation mineure selon l'art. 35 OPPh (minor use).
Mode d'action	La matière active de Dialen est absorbée par les feuilles et les racines et est véhiculée facilement dans la plante. La croissance est arrêtée rapidement. Selon les adventices, le processus du dépérissement peut s'étendre sur plusieurs semaines. Les meilleurs résultats s'obtiennent en traitant tôt (aux stades 2 à 6 feuilles des mauvaises herbes).
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie.

	Mélanges: Dialen est miscible avec Glifonex TF, Landmaster Supreme 480 TF, ou Frontier X2. **Protection de l'utilisateur:** Préparation de la bouillie: Porter des lunettes de protection ou une visière
Rotation des cultures	Dans le cadre d'une rotation de culture normale toutes les cultures peuvent être cultivées.Si du colza, de l'engrais vert ou un mélange graminées-trèfle est semé comme culture suivante, le délai d'attente minimum est de 1 mois après un traitement avec Dialen. En cas d'une rompue précoce, il est possible de refaire l'ensemencement avec du maïs.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt. 5 lt.
®	Marque déposée par Syngenta.
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 03.02.26/RH/LG0000

4665 Oftringen AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch