Duplosan® KV Combi

Erbicida

Erbicida selettivo a lungo spettro d'efficacità per la campicoltura, la frutticoltura, tappeti erbosi e terreni sportivi. Distrugge a basso dosaggio tutte le malerbe importanti annuali e perenni, sensibili agli ormoni.

Prodotto	Duplosan® KV Combi è uno concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 30.7 % (350 g/l) Mecoprop-P, 14 % (160 g/l) 2,4-D. (W-5164)
Colture	Campicoltura, coltivazione piante ornamentali, frutticoltura.
Spettro di efficacia	Senape dei campi, amaranto, ricacci di colza, romice da seme, cardo campestre, veronica, galinsoga, ranuncolo dei campi, ravanello selvatico, erba storna comune, borsa pastore comune, attaccaveste, poligono persicaria, poligono avicolare, poligono convolvolo, farinello comune, papavero, centonchio comune, convolvolo. Azione parziale: canapetta comune, camomilla comune, falsa ortica.
Applicazione Frutticoltura	**Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 2.5 -3.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali e dicotiledoni pluriennali*. Informare, affinché terze persone non entrino nella particella. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Non trattare con irroratrice o atomizzatore a zaino. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Campicoltura	**Cereali:** 2.5 -3.25 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali e dicotiledoni pluriennali*. Applicazione: primavera. Stadi 21-29 (BBCH). Informare, affinché terze persone non entrino nella particella. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Prati e pascoli:** 2.5 -3.25 lt/ha, contro *Cardi annuali, Veratro comune.* Azione parziale: *Specie di romice.* Applicazione: prima della risemina. Trattamento su tutta la superficie. Informare, affinché terze persone non entrino nella particella. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Coltivazione piante ornamentali	**Tappeti erbosi e terreni sportivi:** 4 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali e dicotiledoni pluriennali.* Azione parziale: *Bugola, Ellera terrestre comune, Varietà di veronica*. Applicare solo nei giorni con temperature diurne tra 10 e 20°C e temperature notturne superiori a 5°C. Assicurarsi che qualsiasi persona che - fino al taglio successivo, compresa la rimozione dell'erba tagliata - entri in un prato trattato, indossi una camicia a maniche lunghe + pantaloni lunghi. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque

	superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Le materie attive di Duplosan® KV Combi, sono assorbite tramite le foglie delle malerbe e vengono distribuite in tutta la pianta. Esse causano una crescita anomala, la quale porta finalmente al deperimento delle piante colpite. Legati all'alta selettività del prodotto, la crescita dei cereali e delle altre graminacee non sono colpite.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Duplosan® KV Combi è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	---
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 208 Contiene [2,4-dichlorophénoxyacétique]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di

	lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	10 lt
®	Marchio registrato Nufarm GmbH AUS
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni segnalate.

Version 22.12.22/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch