FLÜSSIGER BLATTDÜNGER

final K®

Kalium-Blattdünger









Was ist Final K® ?

Final K® ist ein konzentriertes, flüssiges Produkt auf Kalium-Basis, 100% wasserlöslich. **Final K®** verhindert und behebt Kaliummangel.

Kalium stimuliert durch Photosynthese die Produktion, die Translokation und die Speicherung von Zucker in Wurzeln, Knollen und Körnern.

Kalium reduziert die Anfälligkeit der Pflanzen auf Wasserstress und erhöht die Kältetoleranz.

5413 Birmenstorf, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Final K® ist ein Produkt, das speziell formuliert wurde, um antagonistische Wirkungen der im Wasser vorhandenen Ca++ und Mg++-Ionen vorzubeugen und somit die Wirkung des Kalis aufrechtzuerhalten.

Da **Final K®** direkt auf die Blätter gesprüht wird, ist das Kalium schnell verfügbar und wirkt auf verschiedene Weise:



- Verbessert den Ertrag.
- Dank spezieller Formulierung wird **Final K®** auch unter trockenen Bedingungen über das Blatt aufgenommen.
- Erhöht die Stressresistenz.

Die Anwendung von **Final K®** ist völlig sicher, da es frei von Chlor, Schwefel und Nitrat- sowie Ammoniumstickstoff ist.

Zusammensetzung von Final K®

Wirkstoffe:	
Kalium (K_2O)	462 g/l
Gesamt Stickstoff (N) unter Harnstoffform	45 g/l
Verpackung:	20 l

Verträglichkeit

Bei Mischungen, die nicht mehr als 2 Produkte beinhalten dürfen, sind diese vorgängig zu testen. Für maximale Wirksamkeit auf trockenen Blättern anwenden.

Nach der Behandlung sollte 3-4 Stunden kein Regen fallen, um ein optimales Eindringen zu gewährleisten.

Blattapplikation

Feldbau		
Getreidebau	3 - 4 l/ha	Beginn Ährenschieben.
Mais	3 - 4 l/ha	4 - 6 Blattstadium.
Raps	3 - 4 l/ha 3 - 5 l/ha	im Herbst zur Stärkung des Wurzelwachstums. Im Frühjahr, Beginn der Blüte.
Futter- und Zuckerrüben	5 - 10 l/ha	1 - 2 Anwendungen, ab BBCH 18-38 (vor Bestandesschluss).
Kartoffeln	5 l/ha	4 Anwendungen, ab BBCH 38 (ab Bestandesschluss).

Vorteile

Kalium (K) fördert:

Die Leistung:	Kräftigt das Wachstum und fördert die Fruchtentwicklung, sowie die Reifung der Früchte.
Die Qualität:	durch eine bessere Konzentration von Zucker (Brix) durch bessere Färbung (Anthocyane und Carotine) durch bessere Hautqualität (Zellwände) durch eine bessere Anreicherung von Zucker (Stärke)











Empfehlung

Bodenapplikation		
alle Kulturen	50 l/ha	vor der Pflanzung.

Empfehlung

Spezialkulturen	Blattapplikation	
Erdbeeren	4 - 5 x 2 l/ha	Behandlung vor der ersten Blüte. Während des Wachstums der Früchte Behandlung fortsetzen.
Kernobst	4 x 2,5 l/ha 4 x 3 l/ha	auf ausgewogene Bäume anwenden, auf Bäume mit starkem Fruchtbehang anwenden, vom frühen Fruchtansatz bis 3 - 4 Wochen vor der Ernte.
Steinobst (ausser Kirschen)	4 x 2,5 l/ha 4 x 3 l/ha	auf ausgewogene Bäume anwenden, auf Bäume mit starkem Fruchtbehang anwenden, vom frühen Fruchtansatz bis 3 - 4 Wochen vor der Ernte.
Kirschen	2 x 3 l/ha 4 - 5 l/ha	vom frühen Fruchtansatz und 10 - 15 Tage danach. zwischen der Ernte und dem Blattfall.
Reben	3 x 2 - 3 l/ha	zwischen dem Schliessen der Trauben und Mitte Farbumschlag.
Lauch	5 x 3 - 5 l/ha	während der gesamten Wachstumsphase. Anzahl der Anwendungen während der Ausreifung im Herbst erhöhen, wenn die Auswaschung hoch ist.
Karotten - Sellerie	5 x 3 l/ha	ab 10 Blattstadium und während der Wachstumsphase.
Kohl - Blumenkohl	3 x 4 - 5 l/ha	im 6 Blattstadium und während der Wachstumsphase.
Gurken - Kürbis	1 x 2 l/ha 3 - 5 x 2 l/ha	vor der ersten Blüte. Während der Wachstumsphase.
Tomate - Peperoni - Aubergine	1 x 2 l/ha 3 - 5 x 2 l/ha	vor der ersten Blüte. Während der Wachstumsphase.
Spinat	3 x 2 - 3 l/ha 4 - 5 x 2 - 3 l/ha	alle 10 Tage ab Reihenschluss. bei Herbst-/Winterspinat. 15 Tage vor der Ernte nicht mehr anwenden.
Melonen	2 x 3 l/ha	im 6 Blattstadium und zu Beginn der Wachstumsphase der Früchte.

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch