Finy®

Herbicide

Herbicide contre les dicotylédones dans toutes les céréales.

Produit	Finy® est un granulé soluble dans l'eau (SG) et contient 20% metsulfuron-méthyl. (W-6921-1)
Cultures	Grande culture.
Spectre d'efficacité	Agrostide jouet de vent, Panic pied-de-coq, Pâturin annuel, Ray-grass, Sétaire, Amarante, Bleuet, Bourse-à-pasteur, Chamomille, Chénopode, Coquelicot, Ethuse, Galinsoga, Herbe aux écus, Laiteron, Lamier, Mercuriale annuelle, Morelle noire, Mouron des oiseaux, Moutarde des champs, Myosotis, Ortie royale, Pensée des champs, Portulac, Ravenelle, Renouée oiseaux, Renouée liseron, Renouée persicaire, Repousses de colza, Repousses de tournesol, Seeçon, Véronique à feuilles de lierre, Chardons des champs, Liseron, Renoncule, Rumex à large feuilles.
Emploi grandes cultures	**Amidonnier, Blé dur, Épeautre:** 25 gr/ha, contre *dicotylédones annuelles*. Application: au printemps; stade 13-30 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Traitement dans des cultures semées au printemps. Pour protéger les plantes non cibles des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 20 m par rapport aux biotopes (selon art. 18a et 18b, LPN). Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive, conformément aux instructions de l'OFAG. Applicable jusqu'au 31.10.2026 au plus tard **Amidonnier, Blé dur, Épeautre:** 40 gr/ha, contre *dicotylédones annuelles*. Application: au printemps; stade 13-30 (BBCH). 1 traitement par culture au maximum. Traitement dans des cultures semées en automne. Pour protéger les plantes non cibles des conséquences liées à la dérive, respecter une zone tampon non traitée de 50 m par rapport aux biotopes (selon art. 18a et 18b, LPN). Cette distance peut être réduite en recourant à des mesures techniques de réduction de dérive, conformément aux instructions de l'OFAG. Applicable jusqu'au 31.10.2026 au plus tar.

Mode d'action	Finy® est un herbicide sélectif conçu pour lutter contre les mauvaises herbes dicotylédones annuelles dans les céréales d'hiver, de printemps et d'automne. Il peut être absorbé aussi bien par les racines que par les feuilles et est rapidement distribué dans la plante. Il agit dans les plantes cibles en inhibant la division cellulaire. L'effet est rapide, de sorte que les mauvaises herbes ciblées sont stoppées dans leur croissance presque immédiatement après le traitement en post-levée et meurent normalement dans les 7 à 21 jours selon le type de mauvaises herbes.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement au travers du tamis dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Sur le blé et l'orge, Finy® peut être utilisé seul ou dans un mélange en cuve. N'appliquez pas de mélanges en cuve avec Finy® sur l'avoine et le triticale.
Rotation des cultures	Dans le cadre d'une rotation de culture normale toutes les cultures peuvent être cultivées.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	60 gr.
®	Marque déposée par UPL. IN
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Leu+Gygax AG

4665 Oftringen AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch