Scheda Tecnica

Leu+Gygax AG

Finy®

erbicida

Erbicida contro le infestanti a foglia larga di tutti i cereali.

Prodotto	Finy® è uno granulare solubile in acqua (SG) e contiene 20 % Metsulfuron-metile. (W-6921-1)
Culture	Campicoltura.
Spettro di efficacia	Fienarola annua, Giavone comune, Loglio, Pabbio, Pennacchini, Amaranto, Borsa pastore comune, Caglio attaccaveste, Camomilla comune, Canapetta comune, Centonchio comune, Cicuta aglina, Crespino dei campi, Erba morella, Erba storna comune, Falsa ortica, Farinello comune, Fiordaliso, Galinsoga, Mercorella, Nontiscordardimé, Papavero, Poligono avicolare, Poligono convolvolo, Poligono persicaria, Portulaca, Ravanello selvatico, Ricacci di colza, Ricacci di girasole, Senape dei campi, Senecione comune, Veronica, Viola di campi, Cardo campestre, Convolvolo, Ranuncolo dei campi, Romice da seme.
Applicazione Campicoltura	**Farro, Grano duro, Spelta:** 25 gr/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In primavera (BBCH 13-30). Al massimo un 1 trattamento per coltura. Trattamento in colture seminate in primavera. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Applicabile fino al 31 ottobre 2026 al più tardi. **Farro, Grano duro, Spelta:** 40 gr/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In primavera (BBCH 13-30). Al massimo un 1 trattamento per coltura. Trattamento in colture seminate in autunno. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni dell'UFAG. Applicabile fino al 31 ottobre 2026 al più tardi.

Scheda Tecnica

Modalità di azione	Finy® è un erbicida selettivo studiato per il controllo delle infestanti annuali dicotiledoni nei cereali invernali ed estivi. Può essere assorbito sia dalle radici che dalle foglie e si distribuisce rapidamente nella pianta. Agisce sulle piante bersaglio inibendo la divisione cellulare. L'effetto è rapido, tanto che le infestanti bersaglio vengono bloccate nella crescita quasi immediatamente dopo il trattamento di post-emergenza e normalmente muoiono entro 7-21 giorni a seconda della specie infestante.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Su grano e orzo, Finy può essere applicato da solo o in miscela con altri prodotti. Non utilizzare miscele con Finy su avena e triticale.
Rotazione delle colture	---
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H319 Provoca grave irritazione oculare. H410 Molto tossico per gli 'rganismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAF. Può essere utilizzato in PER, le 'estrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imball'ggio	60 gr.
®	Marchio registrato UPL. IN
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 01.04.26/RH/RF/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch