Flint®

Fungicida

Fungicida altamente efficace con principio attivo appartenente al gruppo delle strobilurine. Utilizzabile in molte colture con dosaggi ridotti. L'eccellente resistenza alla pioggia garantisce una protezione completa e duratura contro le infezioni fungine. Adatto per IP.

Prodotto	Flint® è un granulés à disperser dans l'eau (WG) e contiene 50 % trifloxystrobine. (W-5994)
Culture	Coltivazione di bacche (B), Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O), Viticoltura (W), Coltivazione piante ornam. (Z).
Spettro di efficacia	Agente della macchia a forma di dollaro, Altenariosi delle carote, Alternaria spp., Alternariosi delle solanacee, Antracnosi, Antracnosi dei piccoli frutti, Antracnosi del ciliegio, Antracnosi del fagiolo, Avvizzimento dei corimbi del sambuco, Botryosphaeria obtusa (Black rot), Cancri del fusto del lampone, Cancri del fusto della mora di rovo, Cancro gommoso, Cilindrosporiosi del ciliegio, Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Colletotrichum graminicola, Elmintosporiosi, Entomosporiosi del cotogno, Escoriosi della vite, Filo rosso del tappeto erboso, Macchie estive, Maculatura anulare nera del cavolo, Maculature fogliari, Mal dello sclerozio, Malattie da stoccaggio [Lenticellosi, muffa (Monilia), marciume grigio, muffa verde], Marciume da phoma delle crocifere, Marciume dei frutti da Colletotrichum, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume nero, Marciume nero, Monilia dei frutti, Monilia dei rami e dei fiori, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Oidio del cotogno, Oidio del luppolo, Oidio della fragola, Oidio della mela/pera, Oidio della pesca, Oidio dell'albicocca, Oidio delle carote, Oidio delle Cucurbitacee, Oidio delle graminacee, Oidio delle rose, Oidio delle varietà di ribes, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Peronospora del porro, Peronospora della rosa, Peronospora della vite, Peronospora delle crucifere, Rincosporiosi del tappeto erboso, Rossore parassitario, Rossore parassitario, Ruggine del fagiolo, Ruggine del Lampen, Ruggine

	del pero, Ruggine del porro, Ruggine del susino, Ruggine della rosa, Ruggine delle graminacee, Ruggini delle more, Ruggini su piante ornamentali, Septoriosi del sedano, Ticchiolatura della frutta a granelli, Ticchiolatura della rosa, Vaiolatura della frutta a nocciolo, Vaiolatura rossa della fragola.
Applicazione Coltivazione di bacche (B),	**Fragola:** 300 gr/ha (0.03 %), contro *Oidio della fragola, Vaiolatura rossa della fragola.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Termine d'attesa: 2 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "piena fioritura fino all'inizio dell'arrossamento dei frutticini", 4 piante/m², trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Lampone:** 200 gr/ha (0.02 %), contro *Cancri del fusto del lampone, Ruggine del lampone*. Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto. Per i lamponi estivi la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. Per i lamponi autunnali la dose si riferisce ad una siepe di 150 - 170 cm d'altezza, trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno

	areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Mini-Kiwi:** 0.04 %, contro *Marciume dei frutti da Colletotrichum.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Mirtillo:** 300 gr/ha (0.03 %), contro *Antracnosi dei piccoli frutti.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Termine d'attesa: 2 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Mora:** 200 gr/ha (0.02 %), contro *Cancri del fusto della mora di rovo, Ruggini delle more*. Applicazione: Prima della fioritura e dopo il raccolto. Per le more la dose indicata si riferisce allo stadio "inizio fioritura fino a 50% dei fiori aperti", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va

	adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina:** 300 gr/ha (0.03 %), contro *Antracnosi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina:** 200 gr/ha (0.02 %), contro *Oidio delle varietà di ribes*. Applicazione: Stadi 11-79 (BBCH). Termine d'attesa: 2 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare

	in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Sambuco nero:** 0.025 %, contro *Antracnosi dei piccoli frutti, Avvizzimento dei corimbi del sambuco.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Uva spina:** 300 gr/ha (0.03 %), contro *Oidio delle varietà di ribes*. Termine d'attesa: 2 Settimane. La dose indicata si riferisce allo stadio "allegagione (50 - 90% delle infiorescenze hanno frutti visibili)", trattamento con una quantità standard di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva

	rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Campicoltura (F),	**Luppolo:** 0.012 %, contro *Oidio del luppolo*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 2 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Patate:** 250 gr/ha, contro *Alternariosi delle solanacee*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Trattamento durante la piena crescita delle piante. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Orticoltura (G),	**Angurie, Meloni, Zucca da olio, Zucche (buccia non commestibile) (Pieno campo):** 250 gr/ha, contro *Cancro gommoso Oidio delle Cucurbitacee*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della

	deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Angurie, Meloni, Zucca da olio, Zucche (buccia non commestibile) (Serra):** 250 gr/ha, contro *Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. **Baby-Leaf (Asteraceae) (Pieno campo):** 400 gr/ha, contro *Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Baby-Leaf (Asteraceae) (Serra):** 400 gr/ha, contro *Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. **Carote:** 400 gr/ha, contro *Altenariosi delle carote, Oidio delle carote*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare

	al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli di Bruxelles, Cavoli fogliacei:** 400 gr/ha, contro *Maculatura anulare nera del cavolo, Maculature fogliari, Marciume da phoma delle crocifere.* Azione parziale: *Peronospora delle crucifere*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Cetrioli, Zucche con buccia commestibile (Pieno campo):** 400 gr/ha (0.04 %), contro *Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Cetrioli, Zucche con buccia commestibile (Serra):** 500 gr/ha (0.05 %), contro *Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee.* Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Giorni. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare

	prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. **Cicoria belga:** 400 gr/ha, contro *Alternaria spp.*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Fagioli con baccello (Serra):** 400 gr/ha (0.04 %), contro *Antracnosi del fagiolo, Ruggine del fagiolo*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco o dall'apparizione dei primi sintomi Stadi 13-79 (BBCH). Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo un 1 trattamento per coltura.In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Autorizzato come uso minore. **Insalate (Asteracee) (Pieno campo):** 400 gr/ha, contro *Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Insalate (Asteracee) (Serra):** 400 gr/ha, contro *Mal dello sclerozio, Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Termine d'attesa: 3 Settimane. Per proteggere le acque sotterranee, è possibile effettuare al massimo 2 applicazioni di prodotti contenenti trifloxystrobin per coltura e

	anno. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. **Porro:** 400 gr/ha, contro *Alternaria spp., Cladosporiosi degli ortaggi a bulbo, Peronospora del porro, Ruggine del porro*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco o dall'apparizione dei primi sintomi Stadi 41-49 (BBCH). Termine d'attesa: 2 Settimane. Per proteggere le acque sotterranee, 1 applicazione al massimo con un prodotto contenente trifloxystrobin per coltura e anno. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Sedano da coste:** 400 gr/ha, contro *Septoriosi del sedano*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Al massimo 2 trattamenti per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Sedano rapa:** 400 gr/ha, contro *Septoriosi del sedano*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Al massimo 2 trattamenti per coltura. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

Frutticoltura (O),	**Albicocco:** 400 gr/ha (0.025 %), contro *Monilia dei rami e dei fiori, Oidio dell'albicocca, Vaiolatura della frutta a nocciolo.* Azione parziale: *Monilia dei frutti*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Applicazione per via aerea. Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 60 metri dalle acque superficiali. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 30 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Albicocco:** 400 gr/ha (0.025 %), contro *Monilia dei rami e dei fiori, Oidio dell'albicocca, Vaiolatura della frutta a nocciolo.* Azione parziale: *Monilia dei frutti*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione.Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Ciliegio:** 280 gr/ha (0.0175 %), contro *Antracnosi del ciliegio, Monilia dei frutti*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.0175% di Moon Privilege. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di

	omologazione. Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Ciliegio:** 400 gr/ha (0.025 %), contro *Antracnosi del ciliegio, Cilindrosporiosi del ciliegio. Monilia dei frutti, Monilia dei rami e dei fiori, Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Cotogno:** 160 gr/ha (0.001 %), contro *Entomosporiosi del cotogno, Oidio del cotogno, Oidio della mela/pera*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captano. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo

	del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno e per più di 2 trattamenti consecutivi. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Cotogno:** 240 gr/ha (0.015 %), contro *Malattie da stoccaggio [Lenticellosi, muffa (Monilia), marciume grigio, muffa verde]*. Applicazione: Stadi 76-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captan 80 o Folpet 80 (0.1%). La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze applicare al massimo una volta nell'indicazione. Non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno.Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Melo:** 240 gr/ha (0.015 %), contro *Botryosphaeria obtusa (Black rot)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captano. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno e per più di 2 trattamenti consecutivi. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque

	superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Melo, Pero / Nashi:** 240 gr/ha (0.015 %), contro *Malattie da stoccaggio [Lenticellosi, muffa (Monilia), marciume grigio, muffa verde], Ticchiolatura della frutta a granelli*. Applicazione: Stadi 76-89 (BBCH). Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captan 80 o Folpet 80 (0.1%). La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze applicare al massimo una volta nell'indicazione. Non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Melo:** 160 gr/ha (0.01 %), contro *Oidio della mela/pera, Ticchiolatura della frutta a granelli*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captano. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno e per più di 2 trattamenti consecutivi. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

	Pero / Nashi: 160 gr/ha (0.01 %), contro *Oidio della mela/pera, Ruggine del pero, Ticchiolatura della frutta a granelli*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Soltanto in combinazione con 0.125% di Captano. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 4 volte all'anno e per più di 2 trattamenti consecutivi. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Pesco/pesco noce**: 400 gr/ha (0.025 %), contro *Monilia dei rami e dei fiori, Oidio della pesca, Vaiolatura della frutta a nocciolo.* Azione parziale: *Monilia dei frutti*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Prugno/Susino**: 400 gr/ha (0.025 %), contro *Monilia dei rami e dei fiori, Oidio della pesca, Vaiolatura della frutta a nocciolo.* Azione parziale: *Monilia dei frutti*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle

	Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le acque sotterranee, un massimo di 3 applicazioni per appezzamento e per anno con un prodotto contenente trifloxystrobin, di cui un massimo di 1 applicazione in autunno. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Viticoltura (W),	**Vite**: 400 gr/ha (0.025 %), contro *Escoriosi della vite, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume nero, Peronospora della vite, Rossore parassitario*. Applicazione: Dalla fioritura al più tardi entro metà agosto. Soltanto in combinazione con 0.125% di Folpet 80 WDG (W 5012) o con 0.15% di Melody combi (W 6070) o con 0.2% di Cyrano (W 6219). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. I lavori successivi nelle colture trattate sono possibili non prima di 24 ore dall'applicazione. È necessario indossare guanti protettivi e indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi). Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

	Vite: 240 gr/ha (0.015 %), contro *Escoriosi della vite, Marciume nero, Peronospora della vite, Rossore parassitario.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: Dallo stadio di 3 foglie, al più tardi entro metà agosto. Soltanto in combinazione con 0.125% di Folpet 80 WDG (W 5012) o con 0.15% di Melody combi (W 6070) o con 0.2% di Cyrano (W 6219). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Applicazione per via aerea. Al massimo 2 applicazioni per via aerea per anno. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 30 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 60 metri dalle acque superficiali. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Vite**: 240 gr/ha (0.015 %), contro *Escoriosi della vite, Marciume nero, Peronospora della vite, Rossore parassitario.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Applicazione: Dallo stadio di 3 foglie, al più tardi entro metà agosto. Soltanto in combinazione con 0.125% di Folpet 80 WDG (W 5012) o con 0.15% di Melody combi (W 6070) o con 0.2% di Cyrano (W 6219). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.

Coltivazione piante ornam. (Z).	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta)**: 0.025 %, contro *Maculature fogliari, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali, Ticchiolatura della rosa.* Azione parziale:*Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Colture da fiore e piante verdi**: 0.04 %, contro *Maculature fogliari, Oidio (diverse specie) su piante ornamentali, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura e anno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Rose**: 0.04 %, contro *Elmintosporiosi, Oidio delle rose, Peronospora della rosa, Ruggine della rosa, Ticchiolatura della rosa.* Azione parziale: *Marciume grigio (Botrytis cinerea)*. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per

	proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Tappeti erbosi e terreni sportivi**: 500 gr/ha contro *Agente della macchia a forma di dollaro, Colletotrichum graminicola, Elmintosporiosi, Filo rosso del tappeto erboso, Macchie estive, Oidio delle graminacee, Rincosporiosi del tappeto erboso, Ruggine delle graminacee*. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per anno e particella. Per la protezione dei mammiferi selvatici max. 1 applicazione con un prodotto contenente trifloxystrobin sulla stessa particella durante un anno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Zucca ornamentale**: 400 gr/ha contro *Cancro gommoso, Oidio delle Cucurbitacee*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco. Per evitare l'insorgenza di resistenze non applicare prodotti contenenti un principio attivo del gruppo dei QoI (Quinone outside Inhibitors) più di 3 volte per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Flint® è un fungicida ad ampio spettro d'azione contenente il principio attivo strobilurina trifloxistrobina, efficace contro una vasta gamma di malattie fungine in diverse colture. Il prodotto ha un'azione preventiva (protettiva) e impedisce l'infezione della pianta e l'ulteriore diffusione della malattia.

Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Flint® è compatibile con i nostri insetticidi. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2 e Sh).
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'UFAG. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 kg.
®	Marchio registrato Bayer (Schweiz) AG
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

4665 OftringenAG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch