Folpet 80 WDG

Fungicida

Fungicida organico per la lotta contro le malattie crittogamiche in frutticoltura e in viticoltura.

Prodotto	Folpet 80 WDG è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 80 % Folpet.
Colture	Campicoltura, Frutticoltura, Viticoltura.
Spettro di efficacia	Antracnosi del ciliegio, Cilindrosporiosi del ciliegio, Deperimento di ortofrutticoli in deposito, Escoriosi della vite, Marciume bianco dell'uva, Marciume grigio (Botrytis cinerea), Marciume lenticellare delle mele, Peronospora del luppolo, Peronospora della vite, Rossore parassitario, Ticchiolatura della frutta a granelli, Ticchiolatura tardiva del melo, Vaiolatura della frutta a nocciolo.
Applicazione Frutticoltura	**Cotogno:** 0.125 % (2 kg/ha), contro *Deperimento di ortofrutticoli in deposito*. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Frutta a nocciolo:** 0.125 % (2 kg/ha), contro *Antracnosi del ciliegio*, *Cilindrosporiosi del ciliegio*, *Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

Viticoltura	**Melo:** 0.125 % (2 kg/ha), contro *Marciume (Botrytis cinerea)* (Azione parziale). Applicazione: durante la fioritura. 1-2 trattamenti. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Melo:** 0.125 % (2 kg/ha), contro *Marciume lenticellare delle mele, Ticchiolatura della frutta a granelli, Ticchiolatura tardiva del melo*. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce a un volume fogliare di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Vite:** 0.15% (1.2kg/ha), contro *Escoriosi della vite*. Applicazione: stadi BBCH 07-10 (C-D). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). SPe 3: per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Vite:** 0.15% (2.4 kg/ha), contro *Marciume bianco dell'uva*. Immediatamente dopo una grandinata, al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

Campicoltura	**Vite:** 0.15% (2 kg/ha), contro *Peronospora della vite.* Azione parziale: Marciume *grigio (Botrytis cinerea).* Effetto secondario: *Rossore parassitario*. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. Anche per applicazione per via aerea. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni dell'UFAG. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Luppolo:** 0.25% (2.25 kg/ha), contro *Peronospora del luppolo.* Termine d'attesa: 2 settimane. Al massimo 5 trattamento per anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minore uso). Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.
Modalità di azione	Folpet, è un fungicida di contatto e deve essere applicato preventivamente. Esso impedisce la germinazione delle spore e la crescita del micelio. Folpet, blocca la respirazione e perturba il metabolismo del fosforo e provoca pure il deperimento delle cellule.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Folpet è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	1 kg. 5 kg. 20 kg.
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 18.02.21/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Telefono 031 839 24 41
www.leugygax.ch