Frontier® X2

Erbicida

Erbicida per la lotta contro le malerbe dicotiledoni (a foglia larga) e le monocotiledoni (graminacee) nella coltura di granoturco, soia, fava, fagiolo, girasole e barbabietola da zucchero. Largo spettro d'efficacia a basso dosaggio.

Prodotto	Frontier X2 è un concentrato emulsionato (EC) e contiene 64 % (720 g/l) Dimethenamid-P. (W-6075-4)
Colture	Campicoltura, Orticoltura.
Spettro di efficacia	digitaria, giavone, panichi, setarie, poa annue, amaranti, borsa del pastore, camomilla, chenopodio, papavero, galinsoga, ortica purpurea, erba morella, erba gallina. Nessuna efficacia contro le malerbe vivaci (es. romici, ecc).
Applicazione **Orticoltura**	**Fagioli con baccello (Pieno campo):** 1.2 lt/ha, contro malerbe *dicotiledoni e monocotiledoni annuali*. Applicazione: in pre-emergenza. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Campicoltura	**Barbabietole da foraggio e da zucchero (Pieno campo):** 0.6 - 1 lt/ha, contro malerbe *dicotiledoni e monocotiledoni annuali*. Applicazione: Stadio 10-16 (BBCH). Trattamento frazionato con un massimo di 3 frazionamenti a intervalli di almeno 10 giorni (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato per particella e per anno). Per proteggere terze persone rispettare una

	zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Fava (Pieno campo):** 1.2 lt/ha, contro malerbe *dicotiledoni e monocotiledoni annuali*. Applicazione: In pre-emergenza. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Girasole, Soia (Pieno campo):** 1.2 lt/ha, contro malerbe *dicotiledoni e monocotiledoni annuali*. Applicazione: in pre-emergenza. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero essere esposte alla deriva. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Mais (Pieno campo):** 1.2 lt/ha, contro malerbe *dicotiledoni e monocotiledoni annuali*. Applicazione: BBCH 0 - 12 Primavera; in pre-emergenza, in post-emergenza precoce. Nessun trattamento, in presenza di persone non protette che potrebbero

	essere esposte alla deriva. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	La materia attiva Diméthénamide-P è assorbita soprattutto da parte dell'ipocotile del germoglio. Diméthénamide-P è solamente efficace al momento della germinazione delle malerbe. Le malerbe sviluppate non vengono più colpite.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, miscelare, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** non mescolare Frontier X2 con olio minerale o fertilizzanti fogliari. **Protezione dell'utente:** durante la preparazione della poltiglia indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi (compresi i lavori di raccolta) in colture trattate: indossare indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	Dopo una coltura di granoturco normale, non ci sono restrizioni colturali. Dopo una lavorazione prematura del terreno è possibile seminare del granoturco o della soia.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Scheda Tecnica

	H319 Provoca grave irritazione oculare. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER. Le restrizioni di alcuni programmi, devono essere osservate.
Imballaggio	1 lt. 5 lt.
®	Marchio registrato BASF Ludwigshafen
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 23.02.26/RH/RF/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch