Galipan

Herbizid

Herbizid zur Bekämpfung von Unkräutern und Ungräsern

Produkt	Galipan ist ein Suspensionskonzentrat (SC) und enthält 42.2 % (450 g/l) Napropamide. (W-7510)
Anwendungsbereich	Beerenbau (B), Gemüsebau (G), Feldbau (F), Zierpflanzenbau (Z).
Wirkungsspektrum	*Gut erfasst werden:* Bingelkraut, Bluthirse, Borstenhirse, Hühnerhirse, Weisser Gänsefuss, Gemeine Melde, Hederich, Mohn, einjähriges Rispengras, gemeines Rispengras, Hohlzahn, Schwarzer Nachtschatten, Echte Kamille, Vogelmiere, Klebern, Kreuzkraut. *Bei günstigen Bedingungen ausreichend erfasst* werden: Ackerfuchsschwanz, Ackerstiefmütterchen, Franzosenkraut, Rauhaariger Amarant, Hellerkraut, Ackersenf, Erdrauch, Flohknöterich, Vogelknöterich, Windenknöterich, Windhalm, Ehrenpreis.
Anwendung Beerenbau	**Erdbeeren:** 2.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser).* Anwendung: Nach dem Pflanzen. Im Herbst. **Ribes Arten (Freiland), Rubus Arten (Freiland):** 2.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser).* Anwendung: Im Frühjahr, vor dem Austrieb. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).
Gemüsebau	**Baby-Leaf (Brassicaceae) (Freiland):** 0.85 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser).* Anwendung: Vor der Saat oder vor der Pflanzung; mit flacher Einarbeitung (ca. 5 cm tief). Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Phytotoxschäden bei empfindlichen Arten oder Sorten möglich; vor allgemeiner Anwendung Versuchspritzung durchführen. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use).

Feldbau **Zierpflanzenbau**	**Broccoli (Freiland), Kohlrabi (Freiland), Kopfkohle (Freiland), Rosenkohl (Freiland):** 2.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Vor der Saat oder vor der Pflanzung; mit flacher Einarbeitung (ca. 5 cm tief). Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). **Nüsslisalat [gesät]:** 0.85 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Unmittelbar vor der Saat mit flacher Einarbeitung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). **Nüsslisalat [gepflanzt] (Freiland):** 0.85 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Unmittelbar vor der Pflanzung mit flacher Einarbeitung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). **Rucola (Freiland):** 0.85 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Unmittelbar vor oder nach der Saat sowie unmittelbar vor der Pflanzung mit flacher Einarbeitung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). **Rucola (Gewächshaus):** 0.85 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: 4-6 Tage vor der Pflanzung mit flacher Einarbeitung. Maximal 1 Behandlung pro Kultur und Jahr. Bewilligt als geringfügige Verwendung nach Art. 35 PSMV (minor use). **Raps:** 3 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Herbst; Vorsaat mit Einarbeitung; Nachsaat im Vorauflauf ohne Einarbeitung. **Tabak:** 2 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*. Anwendung: Frühjahr; vor oder sofort nach der Pflanzung. **Bäume und Sträucher (ausserhalb Forst):** 2.5 lt/ha, gegen *Einjährige Dicotyledonen (Unkräuter), Einjährige Monocotyledonen (Ungräser)*.

Wirkungsweise	Napropamid gehört zu den Acetamiden. Galipan verhindert die Wurzelbildung und wird über die Sprossteile aufgenommen. Der Wirkstoff bleibt während des Winters aktiv und erfasst auch Frühjahrskeimer.
Herstellung Spritzbrühe	Spritztank zur Hälfte mit Wasser füllen, die abgemessene Menge **Produkt** beifügen und den Spritztank bei laufendem Rührwerk auffüllen. **Anwenderschutz:** Ansetzen der Spritzbrühe: Schutzhandschuhe tragen.
Nachbau	Keine Einschränkung
Einstufung	Achtung  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EUH 401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten. **Produkt** ist kein Bienengift.
Verpackung	5 lt.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 22.12.22/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch