Galipan

Erbicida

Erbicida per il controllo delle erbe infestanti dicotiledoni e graminacee

Prodotto	Galipan è una sospensione concentrata (SC) e contiene 42.2 % (450 gr/lt) Napropamide. (W-7510)
Colture	Campicoltura, coltivazione di bacche, orticoltura, coltivazione piante ornamentali.
Spettro di efficacia	Ben controllate sono: mercorella comune, sanguinella, setaria, giavone piede di gallo, farinello, atriplice erba corregiola, ravanello selvatico, papavero, fienarola annuale, fienarola comune, canapetta comune, erba morella, camomilla comune, centocchio, attaccamano, senecione comune. A condizioni favorevoli, sono controllate a sufficienza: coda di topo, viola dei campi, galinsoga comune, amaranto, erba storna comune, senape / senape selvatica, fumaria, persicaria, correggiola, fallopia / convolvolo nero / poligono convolvolo, cappellini dei campi, veronica comune.
Applicazione **Coltivazione di bacche** **Orticoltura**	**Fragola:** 2.5 lt/ha, contro malerbe d*icotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: dopo la piantagione. In autunno. **Specie di ribes (Pieno campo), Specie di rubus (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali (malerbe) e monocotiledoni annuali*. Applicazione: in primavera, prima del germogliamento. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Baby-Leaf (Brassicaceae) (Pieno campo):** 0.85 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Termine d'attesa: 3 settimane. Applicazione: prima della semina o prima della piantagione; con incorporazione piana (ca. 5 cm di profondità). Al massimo un trattamento per coltura e anno. In colture o varietà sensibili può provocare danni legati ad un'eventuale fitotossicità: effettuare un trattamento di prova prima del trattamento generale. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).

	Broccoli (Pieno campo), Cavoli a testa (Pieno campo), Cavoli di Bruxelles (Pieno campo), Cavolo rapa (Pieno campo): 2.5 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: prima della semina o prima della piantagione; con incorporazione piana (ca. 5 cm di profondità). Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rucola (Pieno campo):** 0.85 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: immediatamente prima o dopo la semina come anche immediatamente prima della piantagione con incorporazione piana. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rucola [piantato] (Serra):** 0.85 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: 4-6 giorni prima della piantagione con incorporazione superficiale. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Valerianella [seminato]:** 0.85 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: direttamente prima della semina con incorporazione piana. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Valerianella [piantato] (Pieno campo):** 0.85 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: direttamente prima della piantagione con incorporazione piana. Al massimo un trattamento per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use).
Campicoltura	**Colza:** 3 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: autunno; incorporamento in presemina; in pre-emergenza dopo la semina, senza interramento. **Tabacco:** 2 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni annuali e monocotiledoni annuali*. Applicazione: primavera; prima o subito dopo la piantagione.
Coltivazione piante ornamentali	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 2,5 lt/ha, contro *malerbe dicotiledoni e monocotiledoni annuali*.

Scheda Tecnica

Modalità di azione	Napropamide, fa parte della famiglia della Acetamide. Galipan evita la formazione delle radici ed è assorbito dal germoglio. La materia attiva, rimane attiva anche durante l'inverno e controlla pure le malerbe che germogliano in primavera.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Galipan è mescolabile secondo consiglio della ditta LG.
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 26.01.23/RH/RF/LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch