Gepard

Insetticida

Insetticida sistemico ad ampio spettro d'azione.

Prodotto	Gepard è un granulare solubile in acqua (SG) e contiene 20 % Acetamiprid. (W-6581-5)
Culture	Coltivazione di bacche (B), Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O), Coltivazione piante ornam. (Z).
Spettro di efficacia	Cecidomie, Mosca della ciliegia, Afidi, Tentredini, Antonomo del melo, Mosca della noce, Criocera a dodici punti, Criocera dell'asparago, Aleurodidi, Afide ceroso del cavolo, Tripidi, Meligete della colza, Dorifora della patata, Apioni dei capolini del trifoglio.
Applicazione **Coltivazione di bacche (B),**	**Lampone, Mora:** 0.25 kg/ha, contro *Cecidomie*. Applicazione: Dopo il raccolto. Fino allo stadio fine sviluppo dei bottoni fiorali. (BBCH 59). Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Ciliegio:** 0.02 % (0.32 kg/ha), contro *Mosca della ciliegia*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. 2 trattamenti a intervalli di 10 giorni. 1° trattamento poco prima dell'invaiatura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli:** 0.01 % (0.16 kg/ha), contro *Afidi*. Applicazione: Da luglio. Termine d'attesa: 3 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello
Frutticoltura (O),	

	stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli:** 0.015 % (0.24 kg/ha), contro *Afidi*. Applicazione: Entro fine giugno. Termine d'attesa: 3 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli, Prugno, Prugnolo:** 0.015 % (0.24 kg/ha), contro *Tentredini*. Applicazione: Alla fine della fioritura (BBCH 69 - 71). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a nocciolo:** 0.015 % (0.24 kg/ha), contro *Afidi*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con

	copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Melo:** 0.02 % (0.32 kg/ha), contro *Antonomo del melo*. Applicazione: Al germogliamento (BBCH 52 - 53). Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Noce comune:** 0.02 % (0.32 kg/ha), contro *Mosca della noce*. Applicazione: A prtire dall'inizio dell'attacco o dall'apparizione dei primi sintomi. Termine d'attesa: 4 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 - 14 giorni. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Nocciolo:** 0.02 % (0.32 kg/ha), contro *Balanino delle nocciuole*. Applicazione: dopo la fioritura. Termine d'attesa: 4 settimane. Al massimo 2 trattamenti per particella e anno ad un intervallo di 10 giorni. Il dosaggio indicato si applica a un volume delle siepi di 10 000 m3/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di ridu-zione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tam-pone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare

	una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 m. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servi-zio di omologazione. Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servi-zio di omologazione. Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presen-tano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore. I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possi-bile garantirne l'efficacia. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025.
Orticoltura (G),	**Asparagi:** 0.25 kg/ha, contro *Criocera a dodici punti*, *Criocera dell'asparago*. Applicazione: Dopo il raccolto. Al massimo 2 trattamenti per particella e per anno ad un intervallo di 21 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Broccoli, Cavoli a testa, Romanesco (Pieno campo):** 0.325 kg/ha, contro *Aleurodidi*. Applicazione: All'inizio dell'attacco. Stadi 41-46 (BBCH). Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 14 giorni. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Carciofi:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa, Cavoli fogliacei, Cavolo rapa (Pieno campo):** 0. 25 kg/ha, contro *Afide ceroso del cavolo*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 - 14 giorni. **Cavoli di Bruxelles (Pieno campo):** 0. 25 kg/ha, contro *Afide ceroso del cavolo*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 - 14 giorni.

	Cavolo rapa (Pieno campo): 0. 25 kg/ha, contro *Aleurodidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per cultura con un intervallo di 10 - 14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cetrioli (Pieno campo):** 0. 15 kg/ha, contro *Afidi*. Applicazione: Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Cetrioli (Serra):** 0.025 %, contro *Afidi*. Applicazione: Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Cetrioli (Serra):** 0.05 %, contro *Aleurodidi*. Applicazione: Intervallo di 7 - 14 giorni tra le irrorazioni. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Cicoria pan di zucchero, Tipi di radicchio e cicorino:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Cipolle:** 0.5 kg/ha, contro *Tripidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Erbette da cucina, Insalate asiatiche (Brassicacee), Lattuga da taglio, Portulaca:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Prima dell'intervento occorre verificare su una piccola superficie la tolleranza della pianta al trattamento. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Insalate (Asteracee):** 0.15 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi.

Campicoltura (F),	**Melanzana, Peperone, Pomodori (Serra):** 0.025 %, contro *Afidi*. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Melanzana, Peperone, Pomodori (Serra):** 0.05 %, contro *Aleurodidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Meloni:** 0.125 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Piselli senza baccello:** 0.1 kg/ha, contro *Dorifora della patata [su ricacci di patate]*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. **Porro:** 0.5 kg/ha, contro *Tripidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Prezzemolo:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Rucola:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 1 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Prima dell'intervento occorre verificare su una piccola superficie la tolleranza della pianta al trattamento. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Sedano rapa:** 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 2 Settimane. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). **Colza:** 0.125 - 0.15 kg/ha, contro *Meligete della colza*. Applicazione: Prima della fioritura. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. **Patate:** 0.1 kg/ha, contro *Dorifora della patata*. Al massimo 1 trattamento per anno e particella. **Patate da tavola e da foraggio:** 0.2 kg/ha, contro *Afidi*. Al massimo 1 trattamento per anno e particella.

	Tabacco: 0.25 kg/ha, contro *Afidi*. Applicazione: Prima della fioritura. A prtire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura. **Tabacco:** 0.5 kg/ha, contro *Aleurodidi*. Applicazione: Prima della fioritura. A prtire dall'inizio dell'attacco. Al massimo 2 trattamenti per coltura. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Trifoglio per la produzione di sementi:** 0.25 kg/ha, contro *Apioni dei capolini del trifoglio*. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella. Pericoloso per le api: Può entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture vicine, siepi) unicamente in assenza di volo delle api (di sera). **Barbabietole da zucchero:** 0.2 kg/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa: 90 giorni. Al massimo 1 trattamento per coltura. Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di ridu-zione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servi-zio di omologazione. Pericoloso per le api – Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presen-tano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Non deve essere applicato quando nelle particelle vicine ci sono piante in fiore. Omologazioni in situazioni di emergenza, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010, sono autorizzati temporaneamente fino al 30 settembre 2025.
Coltivazione piante ornam. (Z).	**Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Colture da fiore e piante verdi, Rose:** 0.5 kg/ha, contro *Aleurodidi*. Al massimo 2 trattamenti per anno e particella con prodotti dello stesso gruppo di principi attivi. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a

	causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	L‘acetamipride appartiene alla famiglia chimica dei neonicotinoidi. Agisce per contatto e ingestione sui recettori ACH (acetilcolina esterasi) del sistema nervoso centrale (agonista delle sinapsi tra la membrana e il nervo, il contrario degli inibitori ACH come piretroidi, organofosfati, ecc.) L‘azione dell‘acetamipride provoca convulsioni e paralisi nell‘insetto. Nelle piante, l‘acetamipride ha un‘azione sistemica e translaminare (trasportato dal flusso della linfa). Ciò significa che raggiunge gli insetti sul lato opposto della foglia e sui nuovi germogli. L‘acetamiprid agisce su uova, larve e adulti.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l‘acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l‘agitatore in funzione. **Miscibilità:** Gepard est miscible avec nos spécialités antiparasitaires selon le guide L + G. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protet-tivi. Applicazione della poltiglia: Indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l’applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H361d Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.

imballaggio	1 kg. 3 kg.
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 28.02.25/RH//LG0000

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch