Goltix® 700 SC

erbicida

Erbicida con azione fogliare e residuale contro le erbacce nella barbabietola e nelle colture vegetali.

Prodotto	Goltix® 700 SC è una sospensione concentrata (SC) e contiene 58.3 % (700 g/l) Metamitron. (W-6875)
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G).
Spettro di efficacia	Goltix 700 SC distrugge la germinazione e l'accumulo di erbe infestanti (fienarola annuale, cappellini die campi) e erbacce a foglia larga come cavolo francese, grespino comune, borsa del pastore, centocchio, camomilla, atriplice erba correggiola ecc.
Applicazione Orticoltura (G)	**actaea racemosa, Rhodiola rosea (Pieno campo):** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Poa annua*. Applicazione: Dallo stadio BBCH 14. Dal 2° anno. Trattamento frazionato: 3 x 1 l/ha. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di radici secche. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di prodotti per infusi. **Actaea racemosa, Rhodiola rosea, Valeriana (Pieno campo):** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Dallo stadio BBCH 14. Durante l'anno di piantagione. Dopo la radicazione della coltura. Trattamento frazionato: 3 x 1 l/ha. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di radici secche. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di prodotti per infusi. **Barbabietola:** 3 - 5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza e in post-emergenza. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). La dose

	d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; La dose più elevata per i suoli pesanti e ricchi di humus. **Bietola [piantato]** (**Pieno campo):** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: 6-8 giorni dopo la piantagione. Dallo stadio BBCH 12. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Al massimo un 1 trattamento per coltura. **Bietola [seminato]** (**Pieno campo):** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Prima dell'emergenza delle colture. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Al massimo un 1 trattamento per coltura. **Carvi, Finocchio aromatico** (**Pieno campo):** 4.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: L'anno della semina. Dallo stadio BBCH 14. Trattamento frazionato: 3 x 1.5 l/ha. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di semi e frutta secca. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di infusi o di condimenti. **Cetrioli, Zucchine** (**Pieno campo):** 5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: trattamento della superficie tra le file. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Al massimo un 1 trattamento per coltura. La dose si riferisce alla superficie effettiva da trattare. Può essere applicato soltanto su colture con foglio di pacciamatura: trattamento della superficie tra le file, applicazione esclusivamente con campana di protezione. Il prodotto non deve entrare in contatto né con la coltura né con il foglio di pacciamatura. **Erba cipollina** (**Pieno campo):** 4.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Trattamento frazionato: 3 x 1.5 l/ha. Dallo stadio BBCH 12. Termine d'attesa: 40 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche.

	Maggiorana, Santoreggia, Timo (**Pieno campo):** 4.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Trattamento frazionato: 1.5 l/ha in pre-emergenza, 2 x 1.5 l/ha in post-emergenza. Fino allo stadio 33 (BBCH). Termine d'attesa: 40 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. **Menta, piantaggine lanciuola** (**Pieno campo):** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Dallo stadio BBCH 14. Dal 2° anno. Trattamento frazionato: 2 x 1 l/ha. Termine d'attesa: 21 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di prodotti per infusi. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di foglie e fiori secchi. **Origano, Timo** (**Pieno campo):** 4.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Prima e dopo il germogliamento fino allo stadio 33 (BBCH). Dal 2° anno. Trattamento frazionato: 3 x 1.5 l/ha. Termine d'attesa: 40 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di foglie e fiori secchi. **Origano** (**Pieno campo):** 4.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Trattamento frazionato: 3 x 1.5 l/ha, stadi 13-30 (BBCH). Dopo la piantagione. Termine d'attesa: 40 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione.

Campicoltura (F)	**piantaggine lanciuola** (**Pieno campo):** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Dopo l' emergenza. Dallo stadio BBCH 14. Trattamento frazionato: 2 x 1 l/ha. L'anno della semina. Termine d'attesa: 21 Giorni. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 6-14 giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di prodotti per infusi. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di foglie e fiori secchi. **Rucola** (**Pieno campo):** 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Prima della semina, incorporare a 5 cm di profondità. Termine d'attesa: 35 Giorni. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Al massimo un 1 trattamento per coltura. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. **Spinaci** (**Pieno campo):** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: In pre-emergenza. Autorizzato come uso minore secondo l'art. 35 OPF (minor use). Al massimo un 1 trattamento per coltura. Il prodotto può provocare danni alla coltura. Rispettare le misure di prevenzione fissate dal titolare dell'autorizzazione. **Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 3 - 5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: In pre-emergenza e in post-emergenza. Trattamtno frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
Modalità di azione	Il metamitron agisce attraverso il suolo e le foglie delle piante infestanti sulla fotosintesi delle piante.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Non è consentito aggiungere alcun insetticida alla miscela Goltix 700 SC + olio erbicida e Goltix 700 SC + Betam o Beta Star. L'aggiunta di fertilizzanti liquidi non è generalmente possibile. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale

	possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Se una coltura di barbabietole non ha successo per qualsiasi motivo, la risemina della barbabietola è possibile senza aratura. Le patate o il mais possono essere coltivati dopo un'aratura profonda.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2).
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 28.02.25/RH/RF/LG1112

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch