Scheda Tecnica

Goltix® Gold

erbicida

Erbicida con azione fogliare e residuale contro le erbacce nella barbabietola e nelle colture vegetali.

Prodotto	Goltix® Gold è una sospensione concentrata (SC) e contiene 59.9 % (700 g/l) Metamitron. (W-7130)
Culture	Coltivazione di bacche, Orticoltura, Campicoltura.
Spettro di efficacia	Goltix® Gold distrugge la germinazione e l'accumulo di erbe infestanti (fienarola annuale, cappellini die campi) e erbacce a foglia larga come cavolo francese, grespino comune, borsa del pastore, centocchio, camomilla, atriplice erba correggiola ecc.
Applicazione **Coltivazione di bacche (B)**	**Fragola:** 1.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe) Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Applicazione in autunno dopo il raccolto o dopo la piantagione. Tener presente la sensibilità delle varietà. Quelle tolleranti devono figurare sull'etichetta. In caso di trattamento frazionato, 2 x 1 l/ha
Orticoltura (G)	**Barbabietola:** 3 - 5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In post-emergenza. È possibile effettuare un trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). La dose d'applicazione più bassa per i suoli sabbiosi e poveri di humus; La dose più elevata per i suoli pesanti e ricchi di humus.
Campicoltura (F)	**Barbabietole da foraggio e da zucchero:** 3 - 5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza e in post-emergenza. È possibile effettuare un trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato).
Modalità di azione	Il metamitron agisce attraverso il suolo e le foglie delle piante infestanti sulla fotosintesi delle piante.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione.

Scheda Tecnica

	Miscibilità: Non è consentito aggiungere alcun insetticida alla miscela Goltix Gold + olio erbicida e Goltix Gold + Betam o Beta Star. L'aggiunta di fertilizzanti liquidi non è generalmente possibile. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	Se una coltura di barbabietole non ha successo per qualsiasi motivo, la risemina della barbabietola è possibile senza aratura. Le patate o il mais possono essere coltivati dopo un'aratura profonda.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio. SPe 2 Onde proteggere le acque sotterranee evitare i trattamenti nelle zone di protezione delle acque sotterranee (S2).
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	Marchio registrato Adama IL
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 03.03.25/RH/RF/LG1114

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch