Granat

erbicida

Erbicida residuale sistemico per l'arboricoltura, colza, le colture orticole e le piante ornamentali.

Prodotto	Granat è uno sospensione concentrata (SC) e contiene 35.4 % (400 g/l) Propizamide. (W-6703-1)
Culture	Coltivazione di bacche (B), Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O), Coltivazione piante ornam. (Z).
Spettro di efficacia	Granat funziona molto bene contro gramigna comune, cappellini dei campi, fiordaliso vero, coda di topo, avena selvatica, grano volontario, forasacco, panico, loietto, fienarola, Sorghum halepense, farinello, poligono, papavero, ranuncolo, piantaggine, romice comune (piantine), erba morella, centocchio.
Applicazione **Coltivazione di bacche (B),**	**Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina (Pieno campo):** 2.5 - 4 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Da fine ottobre fino a metà gennaio. Applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione. Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione). Su suolo non innevato e non ghiacciato. **Ribes nero, Ribes rosso, Uva spina (Pieno campo):** 5 - 6.25 lt/ha, contro *Gramigna*. Applicazione: Da fine ottobre fino a metà gennaio. Applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione. Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione). Su suolo non innevato e non ghiacciato.
Campicoltura (F),	**Colza:** 1.25 - 1.875 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: In post-emergenza autunno: Stadio 14-16 (BBCH). Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione). Non coltivare varietà di cereali in caso di interramento dei resti di colza a causa dello svernamento. Per la coltivazione seguente sono adatti: patate, barbabietole, piselli, fagioli, colza primaverile e mais.

Orticoltura (G), **Frutticoltura (O),** **Coltivazione piante ornam. (Z).**	**Cicoria belga [produzione delle radici]:** 2.8 - 3.1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Dopo la semina o la piantagione. In pre-emergenza fino a post-emergenza (al più tardi fino allo stadio di 8 foglie della coltura). Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione). È possibile effettuare un trattamento frazionato (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). In caso di deboli precipitazioni e in regioni secche dopo il trattamento procedere ad una innaffiatura. Autorizzato come uso minore. **Insalate (Asteracee) (Pieno campo):** 2.5 - 3.75 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Dopo la semina o la piantagione. Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione). In caso di deboli precipitazioni e in regioni secche dopo il trattamento procedere ad una innaffiatura. **Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 2.5 - 4 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Trattamento invernale (durante la pausa vegetativa). Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione).Su suolo non innevato e non ghiacciato. **Frutta a granelli, Frutta a nocciolo:** 5 - 6.25 lt/ha, contro *Gramigna.* Applicazione: Trattamento invernale (durante la pausa vegetativa). Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione).Su suolo non innevato e non ghiacciato. **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 2.5 - 4 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe).* Applicazione: Da fine ottobre fino a metà gennaio. Applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione. Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione).Su suolo non innevato e non ghiacciato. **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 5 - 6.25 lt/ha, contro *Gramigna.* Applicazione: Da fine ottobre fino a metà gennaio. Applicare al più presto 6 mesi dopo la piantagione. Nessuna efficacia contro attaccamani e composite diverse (galinsoga, camomilla e senecione).Su suolo non innevato e non ghiacciato.
Modalità di azione	Il principio attivo del Granat viene assorbito prevalentemente dalle radici e trasportato nella pianta per via apoplastica. Nelle piante sensibili impedisce la formazione dei microtubuli.

	L'effetto è lento. Il trattamento deve essere effettuato possibilmente nella stagione fredda. Come erbicida per il terreno, Granat necessita di sufficiente umidità per essere efficace.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Il granato è miscelabile secondo la guida LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.
Rotazione delle colture	Dopo l'aratura del colza a causa del gelo invernale, non è consentito coltivare cereali. Patate, barbabietole, piselli, fagioli, colza estiva e mais sono adatti alla ricoltivazione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH208 Contiene [1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one]. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.