Haneia®

Zink, Mangan



- ✓ **Stimuliert die Assimilation**
- ✓ **Verbessert den Gehalt an Getreideprotein**
- ✓ **Stimuliert die Photosynthese**

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
www.leugygax.ch

Leu+Gygax AG

Wirkungsspektrum

Verbessert den Gehalt an Getreideprotein. Stimuliert die Photosynthese und Biosynthese. Stimuliert die Assimilation nach der Blüte.

Produkteprofil

Formulierung:	Flüssige Formulierung
Wirkstoff:	1% Zink, 1 % Mangan

Wirkungsweise

Haneia® ist ein Blattdünger, der Stoffwechselaktivatoren und Spurenelemente enthält. Er verbessert die Nährstoffversorgung der Pflanze: bessere Aufnahme und Remobilisierung von Elementen in der Pflanze. Ausserdem erhöht **Haneia®**den Proteingehalt des Getreides.



Anwendung

Obstbau allg.:	0.5-1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: während der Kulturdauer. 3-8 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen.
Reben:	0.5-1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: während der Kulturdauer. 3-8 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen.
Getreide:	1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: bei Beginn Blüte (BBCH 60-61), zweite Anwendung gegen Ende der Blüte (BBCH 69) möglich.
Mais:	1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: im 4-6 Blattstadium (BBCH 14-16).
Gemüsebau allg.:	0.5-1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: während der Kulturdauer. 3-8 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen.
Bäume und Sträucher (ausserhalb Fost):	0.5-1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: während der Kulturdauer. 3-8 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen.
Blumenkulturen und Grünpflanzen:	0.5-1 l/ha, *zur Stärkung der Pflanze.* Anwendung: während der Kulturdauer. 3-8 Behandlungen im Abstand von 10-14 Tagen.

Mischbarkeit

Haneia® ist mit unseren Pflanzenschutzmitteln mischbar gemäss LG-Ratgeber.

Produkt vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikette und Produkteinformationen lesen.

Leu+Gygax AG
5413 Birmenstorf AG, Telefon 056 201 45 45
www.leugygax.ch / info@leugygax.ch