Laguna

erbicida

Erbicida per colture estensive e ortaggi.

Prodotto	Laguna è uno sospensione concentrata (SC) e contiene 49.7 % (600 g/l) Aclonifen. (W-7370) .
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G),
Spettro di efficacia	coda di topo, fienarola annuale, cappellini dei campi, panico, loietto italico, grespino dei campi, erba storna comune, senape / senape selvatica, non ti scordar di me minore, amaranto, persicaria maggiore, colza volontaria, camomilla comune, veronica, mercorella comune, farinello, fumaria, senecione comune, ravanello selvatico, borsa del pastore, papavero, galinsoga comune, ortica minore, attaccamano, persicaria, Rote falsa ortica, euforbia calenzuola, correggiola, centocchio.
Applicazione Orticoltura (G),	**Aglio, Cipolle da tavola [seminato], Cipolle dolci [seminato], Scalogni [seminato]:** 1.33 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Trattamento frazionato: 1° trattamento con 0.33 l/ha tra lo stadio orecchiette di topo avanzato e quello di 2 foglie (BBCH 10-12), 2° trattamento con 0.33-0.5 l/ha (BBCH 12-13), 3° trattamento con 0.5 l/ha (BBCH 14). Non utilizzare per la produzione di cipollotti a mazzo. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Bassa dose d'applicazione utilizzabile unicamente in una miscela estemporanea secondo le indicazioni del titolare dell'autorizzazione. Trattamenti con un intervallo di almeno 7 giorni. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Aglio, Cipolle [trapiantato], Scalogni [trapiantato]:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Non applicare su suoli sabbiosi. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti

	della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Aneto, Prezzemolo (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: L'anno della semina. In pre-emergenza. Non utilizzare per la produzione di cipollotti a mazzo. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Carote:** 2-2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Trattamento frazionato: 1 - 1.5 l/ha in pre-emergenza (immediatamente dopo la semina) più 1.0 l/ha in post-emergenza (BBCH 13). Termine d'attesa: 70 Giorni. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Carote:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Termine d'attesa: 80 Giorni. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Cece:** 2.5 - 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-

	emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Cerfoglio, Coriandolo, Dragoncello, Levistico (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Termine d'attesa: 90 Giorni. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Erba cipollina (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Durante il periodo di vegetazione. Termine d'attesa: 90 Giorni. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Al massimo 1 trattamento per anno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Finocchio dolce [seminato]:** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza fino a 2 giorni dopo la semina. Termine d'attesa: 90 Giorni. Occorre far riferimento al rischio di clorosi temporanea della foglia nella fase immediatamente successiva al trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici

	è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Finocchio dolce [piantato]:** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Immediatamente prima della piantagione. Termine d'attesa: 70 Giorni. Occorre far riferimento al rischio di clorosi temporanea della foglia nella fase immediatamente successiva al trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Lenticchia:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Trattamento frazionato: 2.0 l/ha in pre-emergenza più 1.0 l/ha o 2 x 0.5 l/ha in post-emergenza (dallo stadio 3 foglie allo stadio 9 foglie della coltura). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Lenticchia:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. La dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Melissa (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Termine d'attesa: 90 Giorni. Applicazione solamente in colture destinate alla produzione di erbe fresche. Al massimo 1 trattamento per anno. Applicare solo durante il riposo vegetativo a fine inverno. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva

	rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Pastinaca (Pieno campo):** 2.5 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Termine d'attesa: 90 Giorni. Al massimo un 1 trattamento per coltura. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Piselli:** 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In post-emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Piselli:** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Porro (Pieno campo):** 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Dallo stadio BBCH 12. Dopo la piantagione. Trattamento frazionato. Termine d'attesa: 28 Giorni. 2 trattamenti frazionati, 0.5 l/ha per trattamento (la dose indicata corrisponde al quantitativo totale autorizzato). Trattamenti a intervalli di 10-14 giorni. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle

Campicoltura (F),	acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Sedano da coste, Sedano rapa:** 2 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Dopo la radicazione della coltura. ca. 7 giorni dopo la piantagione. Termine d'attesa: 90 Giorni. Occorre far riferimento al rischio di clorosi temporanea della foglia nella fase immediatamente successiva al trattamento. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 3 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Autorizzato come uso minore. **Fava, Girasole, Patate, Pisello proteico:** 3 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In pre-emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 4 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. **Pisello proteico:** 1 lt/ha, contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: In post-emergenza. Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 2 punti come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Laguna è un erbicida con principio attivo Aclonifen che viene assorbito dal coleottile o dall'ipocotile delle infestanti e agisce sulle graminacee e sulle dicotiledoni annuali in fase di germinazione fino allo stadio cotiledonare. Le infestanti colpite ingialliscono durante la germinazione e poi appassiscono

	rapidamente. Un'umidità del terreno sufficiente favorisce l'efficacia. Le infestanti più sviluppate non vengono più controllate in modo efficace. L'uso è consigliato su terreni con un contenuto di humus compreso tra min. 1% e max. 6%. Su terreni humiferi con più del 6% di humus, l'effetto è ridotto. Non trattare Laguna su terreni sabbiosi e molto leggeri.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** con Pendi **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.
Rotazione delle colture	In caso di rotazione precoce della coltura, dopo l'aratura è possibile coltivare piselli proteici, patate, mais, soia o girasoli. In caso di miscugli occorre tenere conto anche delle prescrizioni relative agli altri prodotti.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAF. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	

Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 25.02.26/RH/DE/LG0000

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch