Scheda Tecnica

Legan™ WG

Fungicida

Fungicida per la frutticoltura, la viticoltura e le piante ornamentali.

Prodotto	Legan WG è un granulare idrodispersibile (WG) e contiene 70 % Ditianon. W-7127
Colture	Frutticoltura, Viticoltura, Coltivazione piante ornam.
Spettro di efficacia	Antracnosi del ciliegio, Bolla dell'azalea, Bozzacchioni del susino, Cilindrosporiosi del ciliegio, Escoriosi della vite, Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Peronospora della rosa, Peronospora della vite, Rossore parassitario, Ruggine del susino, Ruggine della rosa, Ruggini su piante ornamentali, Ticchiolatura della frutta a granelli, Ticchiolatura della rosa, Vaiolatura della frutta a nocciolo.
Applicazione Frutticoltura	**Ciliegio:** 0.5% (0.8 kg/ha), contro *Antracnosi del ciliegio, Cilindrosporiosi del ciliegio, Vaiolatura della frutta a nocciolo*. Termine d'attesa: 3 settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Non applicare in tutto piú di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Frutta a granelli:** 0.5% (0.8 kg/ha), contro *Ticchiolatura della frutta a granelli*. Applicazione: Dal germogliamento fino a fine giugno. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Trattamenti dopo la fioritura: non applicare in tutto piú di 3400 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona

	tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Prugno/Susino:** 0.5% (0.8 kg/ha), contro *Bozzacchioni del susino*. Applicazione: Trattamento unico all'apertura delle gemme. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Non applicare in tutto piú di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Prugno/Susino:** 0.5% (0.8 kg/ha), contro *Ruggine del susino*. Termine d'attesa: 3 Settimane. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Non applicare in tutto piú di 1680 g per ha della sostanza attiva ditianon per particella et anno. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Viticoltura	**Vite:** 0.075% (0.6 kg/ha), contro *Escoriosi della vite*. Applicazione: BBCH 7-10 (Stadi C-D). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Al massimo 8 trattamenti per particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon. Non trattare su uva da tavola. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

Coltivazione piante ornam.	**Vite:** 0.05% (0.8 kg/ha), contro *Peronospora della vite*. Applicazione: Trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Al massimo 8 trattamenti per particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon. Non trattare su uva da tavola.Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Vite:** 0.075% (0.6 kg/ha), contro *Rossore parassitario*. Applicazione: Fino a BBCH 55 (stadio G). La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55 (G), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Al massimo 8 trattamenti per particella e anno con un prodotto contenente la sostanza attiva ditianon. Non trattare su uva da tavola. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 0.075%, contro *Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 50 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Azalee:** 0.05%, contro *Bolla dell'azalea*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

	Colture da fiore e piante verdi: 0.05%, contro *Maculature fogliari, Peronospora (diverse specie) su piante ornamentali, Ruggini su piante ornamentali*. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG. **Rose:** 0.05%, contro *Maculature fogliari, Peronospora della rosa, Ruggine della rosa, Ticchiolatura della rosa*. Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Modalità di azione	Legan è un fungicida di contatto a base di Dithianon. La materia attiva agisce in un modo d'azione multi-sit bloccando il meccanismo respiratorio dei funghi. È un potente inibitore della germinazione delle spore e della crescita del micelio. Dopo il trattamento, Legan WG mostra una eccellente ripartizione e aderenza sia sulle foglie sia sul frutto.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderata, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Legan è mescolabile con i nostri fungicidi, insetticidi e acaricidi, ad eccezione degli insetticidi contenenti olio al germogliamento. Attenzione quando si mescolano più prodotti e concimi fogliari come pure con prodotti a base di solfato di rame (poltiglia bordolese) o solfuro di calcio. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto.

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Evitare il contatto del prodotto con acqua. Il prodotto è approvato dall'UFAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 kg 5 kg 10 kg
®	
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le istruzioni indicate.

Version 09.02.26/RH/RF/LG1147

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch