Fiche technique

Leu+Gygax AG

MCPB LG

Herbicide

Herbicide contre les mauvaises herbes dans les prairies, céréales ensemencées, mélanges fourrager, pois.

Produit	MCPB LG est un concentré soluble dans l'eau (SL) et contient 34.8 % 400 g/lt [sous forme de 38.1 % MCPB de sel de sodium (438 g/lt)]. (W-2070)
Cultures	Culture des baies, Culture maraîchère, Grande culture, Culture ornementale.
Spectre d'efficacité	*bonne efficacité:* Moutarde des champs, Herbe aux écus, Rumex à large feuilles (semis), Coquelicot, Fumeterre, Chardons des champs, Galinsoga, Plantago, Chénopode, Liseron, Renoncule. *moyenne efficacité:* Repousses de colza, Dent de lion, Rumex à large feuilles, Chénopode, Bourse-à-pasteur, Ortie royale, Myosotis, Séneçon, Vesces.
Emploi **Culture des baies** **Grande culture**	**Cassis, Framboise, Groseilles à grappes:** 0.4% (4 lt/ha), contre *liserons*. Application: après l'aoûtement des pousses annuelles. **Céréales [avec semis de trèfle intercalaire], pois protéagineux, pommes de terre de consommation et fourragère:** 3.5 - 4 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces*. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Ne pas utiliser sur les plants de pommes de terre. **Mélange trèfles-graminées (prairie artificielle):** 3.5 - 4 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces*. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après traitement. Exception: pour les animaux qui ne produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines. **Prairies et pâturages:** 3.5 - 4 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces*. Application: Après la levée du semis. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après traitement. Exception: pour les animaux qui ne produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines.

Culture maraîchère **Culture ornementale**	**Prairies et pâturages:** 4 - 6 lt/ha, contre *renoncules*. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après traitement. Exception: pour les animaux qui ne produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines. **Prairies et pâturages:** 4 - 6 lt/ha, contre *rumex*. Application: Après la levée du semis. Délai d'attente: 3 Semaine(s). Pâturages ou fourrage (fourrage vert ou conservé) au plus tôt 3 semaines après traitement. Exception: pour les animaux qui ne produisent pas de lait, le délai d'attente est de 2 semaines. **Pois écossés:** 3.5 - 4 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces*. Délai d'attente: 3 Semaine(s). **Arbres et arbustes (hors fôret):** 4% (4 lt/ha) contre *chardons, liserons, rumex à feuilles obtuses [jeunes plantes]*. Ne traiter que les foyers de mauvaises herbes. Sur conifères et thuyas, ne traiter qu'après maturation des pousses de l'année. Indication des cultures et de leur résistance au traitement.
Mode d'action	MCPB LG agit presque exclusivement par les feuilles. Sur les plantes sensibles le MCPB LG provoque une division cellulaire excessive et désordonnée ce qui provoque la mort de celles-ci. La meilleure efficacité est obtenue par temps chaud et poussant, lorsque les mauvaises herbes sont en pleine croissance, les vivaces doivent être suffisamment développées pour pouvoir absorber assez de matière active. MCPB LG est particulièrement indiqué pour lutter contre les renoncules dans les prairies et pâturages. La principale est la renoncule âcre, cet espèce est toxique dans les fourrages car elle contient de l'anémonine, la toxicité est à son plus fort lors de la floraison mais disparaît au cours du processus de séchage.
Préparation de la bouillie	**Préparation de la bouillie:** verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Miscibilité:** --- **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des gants de protection. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.
Rotation des cultures	Après une culture normale, il n'y a pas de restriction culturale.

Fiche technique

Classement	Danger  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H302 Nocif en cas d'ingestion. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Le produit est homologué par l'OSAV. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	5 lt.
®	
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 03.03.26/RH/LG1275

4665 Oftringen AG, Téléphone 056 201 45 45
www.leugygax.ch