MCPB LG

erbicida

Erbicida contro le erbe infestanti nei prati, semina di cereali, miscele di foraggi, piselli.

Prodotto	MCPB LG è uno concentrato solubile in acqua (SL) e contiene 38 % (438.5 g/l) [pari al 34,7 % di MCPB (400 g/L)] MCPB sodio. (W-2070)
Culture	Coltivazione di bacche (B), Campicoltura (F), Orticoltura (G), Coltivazione piante ornam. (Z).
Spettro di efficacia	senape / senape selvatica, erba storna comune, romice comune (piantine), papavero, fumaria, cardo campestre, galinsoga comune, piantaggine, farinello, vilucchio, ranuncolo. **Effetto parziale:** colza volontaria, tarassaco, romice comune, atriplice erba corregiola, borsa del pastore, Equiseti, canapetta comune, senecione comune, non ti scordar di me minore, veccia.
Applicazione **Coltivazione di bacche (B),** **Campicoltura (F),**	**Lampone, Ribes nero, Ribes rosso:** 0.4 % (4 lt/ha), contro *Convolvulaceae*. Applicazione: Dopo la lignificazione dei germogli annuali. **Cereali [con sementi di trifoglio], Patate da tavola e da foraggio, Pisello proteico:** 3.5-4 lt/ha), contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Non applicare su patate da semina. **Miscela trifoglio-graminacee (prati artificiali):** 3.5-4 lt/ha), contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. **Prati e pascoli:** 3.5-4 lt/ha), contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)*. Applicazione: Dopo l'emergenza della semina. Termine d'attesa: 3 Settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane.

Orticoltura (G), **Coltivazione piante ornam. (Z).**	**Prati e pascoli:** 4-6 lt/ha), contro *Specie di ranuncoli*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. **Prati e pascoli:** 4-6 lt/ha), contro *Specie di romice*. Applicazione: Dopo l'emergenza della semina. Termine d'attesa: 3 Settimane. Pascolo o sfalcio (foraggio fresco o conservato) al più presto 3 settimane dopo il trattamento. Eccezione: per gli animali non in lattazione il termine di attesa è di 2 settimane. **Piselli senza baccello:** 3.5-4 lt/ha), contro *Dicotiledoni annuali (malerbe), Dicotiledoni pluriennali (malerbe)*. Termine d'attesa: 3 Settimane. **Alberi e arbusti (al di fuori della foresta):** 0.4 % (4 lt/ha), contro *Convolvulaceae, Romice comune [Piante giovani], Specie di cardi*. Trattare conifere e tuie soltanto dopo la maturazione dei germogli dell'anno. Trattare soltanto i focolai di malerbe. Indicare le colture e la loro tollerabilità.
Modalità di azione	MCPB LG agisce quasi esclusivamente attraverso le foglie. Sulle piante sensibili, MCPB LG provoca un'eccessiva e disordinata divisione cellulare che ne causa la morte. La massima efficacia si ottiene con tempo caldo e umido, quando le erbacce sono in piena crescita; le piante perenni devono essere sufficientemente sviluppate per poter assorbire una quantità adeguata di principio attivo. MCPB LG è particolarmente indicato per combattere i ranuncoli nei prati e nei pascoli. Il principale è il ranuncolo acre, una specie tossica nei foraggi perché contiene anemonina. La tossicità raggiunge il suo picco durante la fioritura, ma scompare durante il processo di essiccazione.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** --- **Protezione dell'utente:** urante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Dopo la normale coltivazione, non ci sono restrizioni di coltivazione.
Classificazione	Pericolo  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H302 Nocivo se ingerito. H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	5 lt
®	
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 03.03.26/RH/DE/LG1275

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch