Scheda Tecnica

Microthiol® LG

Fungicida

Formulazione liquida a base di zolfo per la viticoltura e colture orticole.

Prodotto	Microthiol® LG è una sospensione concentrata (SC) e contiene 57.3 % (825 g/l) Zolfo. (W-7479-1)
Colture	Orticoltura, viticoltura.
Spettro di efficacia	Acariosi della vite, eriofide della vite, escoriosi della vite, oidio della vite, oidio delle barbabietole, oidio delle Cucurbitacee.
Applicazione Viticoltura	**Vite:** 2 % (16 lt/ha), contro *acariosi della vite, eriofide della vite*. Applicazione: irrorazione al germogliamento. Al massimo un trattamento per anno e particella. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 01-10 (B-D), trattamento con una quantità di referenza della poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Pericoloso per le api - Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Vite:** 2 % (16 lt/ha), contro *escoriosi della vite*. Al massimo un trattamento per anno e particella. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 07-10 (C-D), trattamento con una quantità di referenza della poltiglia di 800 l/ha (base per il calcolo). Pericoloso per le api - Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura). Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del servizio di omologazione.

Orticoltura	**Vite:** 0.1 -0.4 % (1.6 -6.4 lt/ha), contro *oidio della vite*. Termine d'attesa: 3 settimane. Applicazione: trattamenti prima e dopo la fioritura al più tardi entro metà agosto. La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenziata di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4'500 m³/ha. La dose va adattata al volume fogliare in base alle istruzioni del servizio di omologazione. Dose più elevata in caso di forte attacco. Per proteggere terze persone rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle superfici abitate e dagli impianti pubblici. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del servizio di omologazione. Per proteggere artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. **Barbabietola:** 1.5 lt/ha, contro *oidio delle barbabietole*. Termine d'attesa: 7 giorni. Applicazione: a partire dall'inizio dell'attacco o dall'apparizione dei primi sintomi. Al massimo 6 trattamenti per coltura. **Cucurbitacee:** 2 lt/ha, contro *oidio delle Cucurbitacee*. Termine d'attesa: 3 giorni.
Modalità di azione	Microthiol® LG è una nuova formulazione a base di zolfo, la quale garantisce una buona adesività e conservazione della pellicola di irrorazione. Accanto alla sua eccellente azione di prevenzione, Microthiol LG può inoltre frenare la formazione delle spore (conidi) e ridurre la sporulazione.
Preparazione della poltiglia	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità di prodotto desiderato, poi completare il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Microthiol® LG è mescolabile secondo consiglio della ditta LG. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + una visiera + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p.es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).

Scheda Tecnica

Rotazione delle colture	Nessuna restrizione.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV e FibL. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
Imballaggio	10 lt
®	Marchio registrato UPL Switzerland AG
Osservazioni	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e seguire le indicazioni di conseguenza.

Version 26.01.23/RH/RF/LG1226

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch