Scheda Tecnica

Monitor®

erbicida

ERBICIDA POST-EMERGENZA per combattere erbe ed erbacce nel frumento primaverile, frumento invernale e la triticale.

Prodotto	Monitor è uno granulare idrodispersibile (WG) e contiene 80 % Sulfosulfuron. W-5463
Culture	Campicoltura (F)
Spettro di efficacia	Da buono a molto buono: Erbacce, Ricacci d'orzo, Gramigna comune, Fienarola comune, Diversi tipi di forasacco, Giavone piede di gallo, Miglio a setole, Sanguinella, Cappellini dei campi, Senape selvatica, Nondiscordardime, Ricacci di colza, Ricacci di girasole, Persicaria, Borsa del pastorem, Vari tipi di camomilla, Attaccamano, Centocchio, Erba storna comune, Viola dei campi (prime fasi). Effetto parziale: coda di volpe, fienarola annuale, avena selvatica, erba di segale, camomilla bastardadi Campi, canapetta dei campi, convolvolo nero, alchemilla, correggiola, farinello. Debole a effetto moderato: cardo campestre, vilucchio dei campi, vari tipi di veronica, papavero rosolaccio vari tipi di ortica.
Applicazione Campicoltura (F),	**Frumento, Triticale:** 12 - 25 g/ha, contro, *Dicotiledoni annuali (malerbe), Gramigna, Monocotiledoni annuali (malerbe)*. Applicazione: Primavera, in post-emergenza (BBCH 23-32). Per proteggere gli organismi acquatici è necessario ridurre il rischio di dilavamento di 1 punto come contemplato nelle istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le piante non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 3 m dai biotopi in virtù degli art. 18a e 18b LNP. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione. Per proteggere le acque sotterranee non applicare prodotti contenenti Sulfosulfuron più di 1 volta ogni 2 anni sulla stessa particella
Modalità di azione	Monitor viene assorbito principalmente tramite le parti verdi della pianta, ma ha anche un certo effetto sul suolo. Il principio attivo interferisce con la sintesi degli aminoacidi e quindi fa

	morire la pianta infestante. Sotto certe condizioni le erbacce stentate rimangono visibili sotto la coltura per qualche tempo. Tuttavia, questi non competono più con la cultura. MONITOR è generalmente molto ben tollerato nel grano invernale e primaverile e nel triticale.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Per aumentare l'effetto fogliare si dovrebbero aggiungere 1-2 l/ha di Codacide. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione.
Rotazione delle colture	Dopo il raccolto dei cereali trattati, esperienza fino ad oggi, si possono coltivare cereali, colza, colture di cattura, trifoglio, patate, legumi o mais.
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	25 gr. 125 gr.
®	Marchio registrato Sumitomo, Japan.
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 06.02.26/RH//LG0752

4665 Oftringen AG, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch