Technisches Merkblatt

Natupol Tripol

Nützlinge (Hummeln)

Zur biologischen Bestäubung einer Vielzahl von Gewächshaus-, Beerenbau-, Obstbau- und Zierpflanzenkulturen.

Produkt	Hummel Tripol sind Lebende Organismen (Insekten) (XV Larven und Adulte) und enthält Bombus terrestris. ()
Anwendungsbereich	Tripol-Bestäubungskästen (mit drei Hummelvölkern) wurden speziell für Freilandkulturen entwickelt. Tripol ist wetterfest, und dank der hervorragenden Dämmung und Belüftung können die Hummeln ihre Aufgabe noch besser erfüllen. Jedes Volk hat ein Beehome-Flugloch, mit dem Sie die Hummeln im Kasten halten können, bis Sie das Loch wieder öffnen. Nach dem Schließen des Fluglochs können Sie erforderliche Pflanzenschutzmassnahmen durchführen oder den Kasten zur Bestäubung einer weiteren Kultur an einen anderen Standort bringen.
Wirkungsspektrum	Bestäubung
Anwendung Tripol	Bestäubung von Freilandkulturen
Wirkungsweise	Nach ihrer Freilassung beginnen die Arbeiterinnen mit dem Bestäuben der Kulturen. Sie werden von weiteren Arbeiterinnen unterstützt, die in den Wochen nach der Einführung schlüpfen.
Ausbringung von Nützlingen	Tripol-Völker können 4 bis 7 Tage vor der Blüte der Kultur aufgestellt werden. Dies hat keine negativen Auswirkungen auf die Völker oder ihre Bestäubungsleistung. • Verteilen Sie die Tripol-Kästen gleichmäßig über das Feld. Die beste Position ist auf einer horizontalen Plattform knapp über dem Boden. • Warten Sie mindestens eine halbe Stunde nach dem Aufstellen der Kästen, damit sich die Hummelvölker beruhigen. Öffnen Sie erst dann die Flugöffnungen des Kastens.

	• Schützen Sie die Kästen vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, und beschweren Sie die Kästen zum Beispiel mit einem Stein, damit sie nicht weggeweht werden. • Öffnen Sie bei warmem Wetter die oben im Kasten befindlichen Lüftungsöffnungen. • Ziehen Sie die weiße Schiebetür jedes Kastens nach oben, bis zwei Öffnungen sichtbar werden (Eingang und Ausgang). Entfernen Sie nicht die kleine schwarze Tür unter dem Deckel. Tripol arbeitet am besten bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10 °C und 30 °C.
Handhabung	• Jeder Hummelkasten enthält Futter, damit die Hummeln während des Transports und der Lagerung in guter Verfassung bleiben. • Um bestmögliche Bestäubungsergebnisse zu gewährleisten, beginnen Sie noch am Liefertag mit dem Einsatz der Hummeln. • Starten Sie spätestens einen Tag nach der Ankunft mit dem Einsatz der Hummeln. • Halten Sie die Hummeln bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 25 °C. • Setzen Sie die Hummelkästen nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
Einstufung	SP 1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
Umweltverhalten	Das Produkt ist vom BLW und FIBL bewilligt. Es kann auch im ÖLN eingesetzt werden, die Vorschriften der einzelnen Labelprogramme sind zu beachten.
Verpackung	Ein Hummelkasten mit drei Hummelvölkern einschließlich einer Königin, 350 - 400 Arbeiterinnen, Brut (Puppen, Eier und Larven) und Zuckerwasser.
®	
Zur Beachtung	Diese Informationsschrift soll beraten. Sie ersetzt die Gebrauchsanweisung nicht. Vor Anwendung des Produktes die Gebrauchsanweisung lesen und genau befolgen.

Version 12.01.22/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Tel. 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Tel. 031 839 24 41
www.leugygax.ch