Novodor® 3 FC

BIO

Insecticide biologique pour lutter contre les larves de doryphores





- ☑ **Effet durable et stoppant.**
- ☑ **Autorisé en l'agriculture biologique.**

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45

www.leugygax.ch

Leu+Gygax SA

Propriétés et particularités de Novodor® 3 FC

Novodor® 3 FC fonctionne en deux étapes. Dans l'estomac des larves, les cristaux sont d'abord dissous et activés par des protéinases. Dans la deuxième phase, les peptiques insecticides activés causent des dommages irréversibles aux membranes cellulaires (nécrose cellulaire) et après l'ingestion du produit, les jeunes larves cessent de se nourrir et meurent au bout de 3 à 5 jours. Les larves plus âgées ne meurent pas dans tous les cas, cependant leur activité alimentaire est tellement réduite qu'aucun autre dommage n'est subi. Sur les doryphores adultes se produira également un effet du fait que leur ponte sera fortement altérée.

Le profil de Novodor® 3 FC

Formulation et matières actives:	SC Suspension concentrée, Bacillus thuringiensis var. tenebrionis 3 % 30 g/l [Préparation de spores, 10'000 IU/mg; souche NB-176]
Emballage:	5 Litres

Application

Pommes de terre: 3-5 lt/ha, contre les larves de doryphore [L1 et L2]. Seulement contre les jeunes stades larvaires. Ne pas utiliser par temps froid.

Aubergine: 0.3-0.5 % contre les larves de doryphore [L1 et L2]. Seulement contre les jeunes stades larvaires. Ne pas utiliser par temps froid.



® Marque déposée

Leu+Gygax SA

5413 Birmenstorf AG, Téléphone 056 201 45 45

Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

www.leugygax.ch / info@leugygax.ch