Oikos®

Insetticida

Insetticida sistemico per colture frutticole, campestri e orticole.

Prodotto	Oikos è un concentrato emulsionato (EC) e contiene 2.36 % (26 g/l) Azadiractina A. (W-7490-2)
Culture	Campicoltura (F), Orticoltura (G), Frutticoltura (O).
Spettro di efficacia	Afide grigio - rosa del melo, Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata.
Applicazione **Frutticoltura**	**Melo:** 0.094 % (1.5 lt/ha), contro *Afide grigio - rosa del melo*. Applicazione: Prefioritura o postfioritura, al più tardi entro fine maggio. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10'000 m³/ha. La dose va adattata al volume di alberi in base alle Istruzioni del Servizio di omologazione. Periodo di applicazione ottimale per l'afide cenerino, stadio E2 (BBCH 59). Per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 m dalle acque superficiali. Tale distanza può essere ridotta attuando le misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.
Orticoltura	**Insalate (Asteracee):** 1.5 lt/ha, contro *Afidi*. Termine d'attesa:1Settimane. In caso di applicazione nelle serre, queste vanno areate a lungo prima di riaccedervi. **Pomodori:** 0.15 %, contro *Afidi, Aleurodidi*. Termine d'attesa: 3 Giorni. Al massimo 3 trattamenti per anno e particella. Dalla comparsa dell'attacco, 2 - 3 applicazioni a intervalli di 7 - 10 giorni.
Campicoltura	**Patate:** 1.5 lt/ha, contro *Dorifora della patata*. Termine d'attesa: 3 Settimane. Al massimo 3 trattamenti per anno e particella. Normalmente con la dose indicata sono necessari 2 trattamenti.

Nota Tecnica

Modalità di azione	Oikos® viene assorbito dalle piante e trasportato in tutta la pianta. Oikos® agisce principalmente per ingestione, ma ha anche un effetto di contatto. Negli insetti, Oikos® impedisce la sites di chitina. Inoltre, Oikos® ha un effetto repellente e influenza l'assorbimento del cibo e la fecondità degli insetti. L'Oikos® è più efficace contro le giovani larve nel ciclo evolutivo degli insetti. Oikos® non agisce contro gli adulti.
Preparazione del porridge	Riempire metà serbatoio con l'acqua, aggiungere la quantità, miscelate i prodotti, poi riempire il serbatoio con l'agitatore in funzione. **Miscibilità:** Oikos® è miscibile con i nostri fungicidi. Note speciali: è preferibile utilizzare acqua leggermente acida, con un pH di 5,5-6. Oikos deve essere applicato in modo protettivo, cioè all'inizio del ciclo di sviluppo dell'insetto. **Protezione dell'utente:** Durante la preparazione della poltiglia: Indossare guanti di protezione. Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi fino a 48 ore dall'applicazione del prodotto (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi).
Rotazione delle colture	Nessuna restrizione
Classificazione	Attenzione  P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.
Comportamento nell'ambiente	Il prodotto è approvato dall'USAV. Può essere utilizzato in PER, le restrizioni di alcuni programmi devono essere osservate.
imballaggio	1 lt. 3 lt.
®	Marchio registrato SIPCAM OXON SPA
Da notare	Questo foglio ti informa e non sostituisce l'etichetta. Prima di utilizzare un prodotto, leggere attentamente l'etichetta e incollarla di conseguenza.

Version 14.03.24/RH/RF/LG0878

5413 Birmenstorf, Telefono 056 201 45 45
www.leugygax.ch