Oxidia

Herbicide

Herbicide pour des céréales d'hiver, des pommes de terre et des oignons.

Produit	Oxidia est un concentré émulsifiable (EC) et contient 78,4 % (800g/l) de Prosulfocarb.
Cultures	Grande culture.
Spectre d'efficacité	Oxidia contrôle bien les adventices tels que vulpin, pâturins, agrostide, gaillet gratteron, véroniques, lamiers, stellaires ainsi que les ray-grass germant tôt.
Emploi **Grande culture**	**Blé d'automne, Épeautre, Orge d'automne, Seigle d'automne, Triticale:** 4-5 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces*. Application: automne, printemps; pré-levée, post-levée précoce. 1 traitement par culture au maximum. Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. **Pommes de terre:** 4-4.5 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces*. Application: post-levée. 1 traitement par culture au maximum. Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG. Seulement pour les pommes de terre de table et les pommes de terre fourragères, ne pas appliquer sur les pommes de terre précoces ni sur les plants de pommes de terre. Tenir compte de la sensibilité de la variété à l'autre composant du mélange. Respecter un délai d'attente de 16 semaines avant la culture suivante. En mélange avec 0.5 lt/ha Conderal SC possible. **Pommes de terre:** 3-5 lt/ha, contre *dicotylédones annuelles, dicotylédones vivaces, monocotylédones annuelles, monocotylédones vivaces*. Application: pré-levée. 1 traitement par culture au maximum.

	Dans le but de protéger les organismes aquatiques des suites d'un ruissellement, respecter une zone non traitée enherbée sur toute la surface de 6 m par rapport aux eaux de surface. Les dérogations figurent dans les instructions de l'OFAG.
Mode d'action	Oxidia est absorbé principalement par l'hypocotyle des mauvaises herbes ; il contrôle les mauvaises herbes et quelques graminées en voie de germination ou en train de lever jusqu'au stade d'une feuille. Les plantes plus développées ne sont pas suffisamment contrôlées. Les gaillets sont sensibles jusqu'au stade d'un verticille.
Préparation de la bouillie	Préparation de la bouillie: verser le produit directement dans le réservoir rempli à moitié d'eau. Ensuite compléter le réservoir selon besoin. Agiter constamment la bouillie. **Mélanges:** Oxidia est miscible avec d'autres produits d'après le guide Leu + Gygax. **Protection des utilisateurs:** Préparation de la bouillie: Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière. Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection + un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure.
Rotation des cultures	Si Oxidia est utilisé seul, il n'y a pas de restriction après la récolte de la culture traitée. Si la culture est interrompue prématurément, on peut ressemer des céréales, du maïs, des pommes de terre, des pois et féveroles. Après une application de Oxidia automne, on peut semer au printemps suivant aussi des betteraves, mais seulement après un labour profond du sol.
Classement	Attention  P102 Tenir hors de portée des enfants. EUH 401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
Comportement dans l'environnement	Non toxique pour les abeilles. Toxique pour les poissons. Eviter le contact du produit avec les eaux. Le produit est homologué par

	l'OFAG. On peut l'utiliser en PER, les restrictions de certains programmes sont à observer.
Emballage	1 lt. 10 lt.
®	
A Observer	Cette fiche vous informe et ne remplace pas l'étiquette. Avant d'utiliser un produit, veuillez lire attentivement l'étiquette et s'y tenir conformément.

Version 09.09.19/RH/LG0000

Leu+Gygax AG

5413 Birmenstorf, Téléphone 056 201 45 45
3075 Rüfenacht, Téléphone 031 839 24 41
www.leugygax.ch